

# **GEK-Report ambulant-ärztliche Versorgung 2007**

## **8 Tabellenanhang**

**Erläuterungen zu den nachfolgenden Tabellen befinden sich in den entsprechenden Textabschnitten des Reportes.**

### **Verzeichnis der Tabellen im Anhang:**

Tabelle A 1:	Anteil Personen mit Arztkontakt nach Wochentagen 2006 (stand.D2005) ..	276
Tabelle A 2:	Anteil Personen mit Arztkontakt nach Geschlecht und Alter 2006.....	277
Tabelle A 3:	Behandlungsfälle, Arztkontakte nach Geschlecht und Alter 2006.....	278
Tabelle A 4:	Allgemeinärzte, Internisten, Kinderärzte: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006 .....	279
Tabelle A 5:	Allgemeinärzte, Internisten, Kinderärzte: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006 .....	280
Tabelle A 6:	Gynäkologen, Urologen: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006 .....	281
Tabelle A 7:	Gynäkologen, Urologen: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006 .....	282
Tabelle A 8:	Augenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006 .....	283
Tabelle A 9:	Augenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006 .....	284
Tabelle A 10:	Laborärzte, Pathologen, Radiologen und Nuklearmediziner: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006 .....	285
Tabelle A 11:	Laborärzte, Pathologen, Radiologen und Nuklearmediziner: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006.....	286
Tabelle A 12:	Orthopäden, Chirurgen: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006 .....	287
Tabelle A 13:	Orthopäden, Chirurgen: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006 .....	288
Tabelle A 14:	Nervenärzte, Psychotherapeuten: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006 .....	289

Tabelle A 15:	Nervenärzte, Psychotherapeuten: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006 .....	290
Tabelle A 16:	Anteil der Bevölkerung mit Diagnosen aus der ambulanten Versorgung nach Diagnosekapiteln 2006 (stand.D2005) .....	291
Tabelle A 17:	Rückenschmerzen (M54): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006 .....	292
Tabelle A 18:	Hypertonie (I10): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006 .....	293
Tabelle A 19:	Refraktionsfehler (H52): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006 .....	294
Tabelle A 20:	Krebsvorsorge (Z12): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006 .....	295
Tabelle A 21:	Lipidämie (E78): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006 .....	296
Tabelle A 22:	Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie.....	297
Tabelle A 23:	Affektive Störungen (F30-F39): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	298
Tabelle A 24:	Depressionen (F32-F33): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	299
Tabelle A 25:	Depressive Episode (F32): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	300
Tabelle A 26:	Rezidivierende depressive Störung (F33): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	301
Tabelle A 27:	Anhaltende affektive Störung (F34): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	302
Tabelle A 28:	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	303
Tabelle A 29:	Phobische Störung (F40): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	304
Tabelle A 30:	Andere Angststörungen (F41): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	305
Tabelle A 31:	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F43): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	306
Tabelle A 32:	Somatoforme Störungen (F45): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	307

Tabelle A 33:	Andere neurotische Störungen (F48): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	308
Tabelle A 34:	Essstörungen (F50): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	309
Tabelle A 35:	Spezifische Persönlichkeitsstörungen (F60): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	310
Tabelle A 36:	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	311
Tabelle A 37:	Hyperkinetische Störungen (F90): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	312
Tabelle A 38:	Störungen des Sozialverhaltens (F91): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie .....	313
Tabelle A 39:	Emotionale Störungen des Kindesalters (F93): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie.....	314
Tabelle A 40:	Verteilung der AU-Fälle und -Tage nach Dauer der AU: 1996 - 2006.....	315
Tabelle A 41:	Arbeitsunfähigkeitsbeginn nach Wochentagen: 2006 .....	316
Tabelle A 42:	Verteilung der Arbeitsunfähigkeitstage auf Wochentage: 2006 .....	316
Tabelle A 43:	AU-Fälle nach Alter und Geschlecht: 2005, 2006 .....	317
Tabelle A 44:	AU-Tage nach Alter und Geschlecht: 2005, 2006 .....	317
Tabelle A 45:	AU-Tage je Fall nach Alter und Geschlecht: 2005, 2006.....	318
Tabelle A 46:	AU-Fälle und AU-Tage je Versicherungsjahr nach Region: 1996 - 2006 (Erwerbstätige insgesamt; stand.).....	318
Tabelle A 47:	AU-Fälle nach ICD10-Kapiteln: 2006 (Erwerbstätige insgesamt; stand.).....	319
Tabelle A 48:	AU-Tage nach ICD10-Kapiteln: 2006 (Erwerbstätige insgesamt; stand.).....	320
Tabelle A 49:	AU-Tage je Fall nach ICD10-Kapiteln: 2006 (Erwerbstätige insgesamt; stand.).....	321
Tabelle A 50:	Relevante 3stellige ICD10-Diagnosen: AU-Fälle 2006 (TOP 100 - Sortierung nach zurechenbaren AU-Tagen) .....	322
Tabelle A 51:	AU-Fälle und -Tage in ausgewählten Berufsgruppen: 2006 (stand.).....	325

*Tabelle A 1: Anteil Personen mit Arztkontakt nach Wochentagen 2006  
(stand.D2005)*

	Alle Kalendertage		Mo.-Sa. ohne Feiertage	
	Ant. (%)	abs. D	Ant. (%)	abs. D
Sonntag	0,23%	189.668	0,23%	189.668
Montag	6,89%	5.680.400	7,48%	6.170.496
Dienstag	6,49%	5.351.899	6,76%	5.571.454
Mittwoch	4,80%	3.959.668	4,85%	3.995.764
Donnerstag	6,48%	5.342.318	6,68%	5.507.802
Freitag	4,67%	3.853.509	4,79%	3.949.867
Samstag	0,43%	357.792	0,43%	357.792

*Tabelle A 2: Anteil Personen mit Arztkontakt nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Männer 1. Quartal	Frauen 1. Quartal	Männer Gesamtjahr	Frauen Gesamtjahr
0	75%	76%	100%	100%
1-4	90%	89%	99%	99%
5-9	80%	78%	97%	96%
10-14	67%	67%	92%	93%
15-19	60%	77%	89%	96%
20-24	50%	78%	83%	97%
25-29	47%	75%	80%	96%
30-34	49%	73%	80%	95%
35-39	50%	71%	79%	94%
40-44	52%	70%	81%	93%
45-49	56%	72%	83%	93%
50-54	62%	75%	86%	93%
55-59	70%	78%	89%	94%
60-64	75%	81%	92%	95%
65-69	80%	85%	94%	96%
70-74	85%	88%	96%	97%
75-79	89%	91%	97%	98%
80-84	92%	93%	98%	98%
85-89	93%	94%	99%	98%
90-	93%	96%	98%	99%

*Tabelle A 3: Behandlungsfälle, Arztkontakte  
nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Behandlungsfälle je Person		Arztkontakte je Person			
	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
0	6,8	6,6	17,2	16,1		
1-4	6,8	6,3	15,3	14,1		
5-9	5,8	5,3	11,6	10,3		
10-14	4,5	4,5	8,7	8,4		
15-19	4,0	7,1	7,5	12,8		
20-24	3,5	7,6	7,1	14,6		
25-29	3,3	7,8	7,1	16,1		
30-34	3,6	7,8	8,0	16,6		
35-39	3,7	7,5	8,7	16,1		
40-44	4,0	7,4	9,7	16,1		
45-49	4,5	7,9	11,3	17,8		
50-54	5,3	8,6	13,8	20,1		
55-59	6,5	9,3	17,9	22,6		
60-64	7,5	9,9	21,1	24,8		
65-69	8,5	10,5	24,2	27,9		
70-74	9,6	10,6	29,4	31,0		
75-79	10,5	10,4	34,3	34,3		
80-84	10,5	9,6	37,0	35,7		
85-89	10,4	9,0	39,8	37,9		
90-	9,1	8,0	38,2	41,1		

*Tabelle A 4: Allgemeinärzte, Internisten, Kinderärzte: Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Allgemeinärzte Anteil Personen mit Beh.		Internisten Anteil Personen mit Beh.		Kinderärzte Anteil Personen mit Beh.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	31,9%	29,7%	3,4%	3,5%	94,6%	95,7%
1-4	41,8%	41,4%	6,3%	5,7%	89,5%	89,1%
5-9	46,9%	46,6%	8,1%	7,5%	73,6%	72,2%
10-14	53,5%	54,0%	10,7%	10,9%	46,6%	45,1%
15-19	65,9%	72,2%	16,8%	21,4%	14,7%	15,1%
20-24	66,7%	76,1%	19,0%	25,5%	0,6%	1,1%
25-29	62,2%	72,2%	19,0%	26,4%	0,4%	1,6%
30-34	62,7%	71,6%	20,7%	26,7%	0,7%	2,5%
35-39	62,6%	72,7%	21,6%	27,3%	0,8%	2,5%
40-44	63,4%	72,6%	23,9%	29,0%	0,6%	1,5%
45-49	65,1%	73,4%	27,1%	32,1%	0,3%	0,6%
50-54	67,4%	73,8%	32,3%	37,2%	0,2%	0,3%
55-59	69,8%	73,7%	40,4%	43,7%	0,2%	0,2%
60-64	69,5%	72,8%	47,7%	49,4%	0,2%	0,2%
65-69	69,7%	73,1%	52,9%	53,1%	0,1%	0,1%
70-74	71,0%	73,9%	57,5%	54,4%	0,2%	0,2%
75-79	73,3%	75,4%	59,3%	52,8%	0,2%	0,2%
80-84	74,3%	76,5%	57,2%	50,5%	0,2%	0,3%
85-89	75,3%	76,9%	55,9%	46,6%	0,4%	0,2%
90-	76,2%	80,3%	50,9%	40,5%	0,4%	0,2%

*Tabelle A 5: Allgemeinärzte, Internisten, Kinderärzte: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Allgemeinärzte Kontakte je 100 Vers.		Internisten Kontakte je 100 Vers.		Kinderärzte Kontakte je 100 Vers.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	194	169	11	8	1261	1206
1-4	253	245	20	17	960	893
5-9	247	239	25	24	511	456
10-14	254	259	37	38	240	215
15-19	320	444	62	93	65	69
20-24	353	505	77	121	3	5
25-29	328	480	81	129	1	3
30-34	362	513	96	141	2	4
35-39	400	577	113	153	1	4
40-44	439	616	140	177	1	3
45-49	521	703	171	218	1	2
50-54	631	790	240	284	0	1
55-59	792	892	345	375	1	1
60-64	894	973	466	469	1	1
65-69	987	1093	576	579	1	1
70-74	1190	1304	728	675	0	1
75-79	1460	1583	828	729	1	1
80-84	1675	1830	871	777	1	1
85-89	1862	2102	963	855	1	1
90-	2162	2546	763	853	0	3



*Tabelle A 6: Gynäkologen, Urologen: Behandlungsraten  
nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Gynäkologen Anteil Personen mit Beh.		Urologen Anteil Personen mit Beh.			
	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
0	3,8%	3,6%	1,1%	0,1%		
1-4	0,5%	0,9%	3,0%	0,5%		
5-9	0,4%	1,0%	4,0%	1,2%		
10-14	0,2%	5,9%	2,1%	0,7%		
15-19	0,5%	58,8%	2,4%	1,8%		
20-24	0,5%	77,3%	4,3%	2,6%		
25-29	0,8%	78,8%	5,2%	2,8%		
30-34	1,3%	75,2%	6,0%	2,7%		
35-39	1,2%	69,4%	5,9%	2,7%		
40-44	0,6%	65,3%	6,5%	3,0%		
45-49	0,4%	63,1%	7,9%	3,4%		
50-54	0,4%	60,2%	10,7%	4,2%		
55-59	0,3%	56,2%	15,2%	5,0%		
60-64	0,4%	55,6%	22,4%	6,1%		
65-69	0,4%	52,9%	29,8%	7,7%		
70-74	0,5%	41,3%	33,8%	8,0%		
75-79	0,5%	28,6%	37,0%	7,9%		
80-84	0,6%	17,5%	35,3%	7,6%		
85-89	0,9%	10,9%	33,8%	5,9%		
90-	1,1%	6,8%	32,2%	5,7%		

*Tabelle A 7: Gynäkologen, Urologen: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Gynäkologen Kontakte je 100 Vers.		Urologen Kontakte je 100 Vers.			
	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
0	8	4	2	0		
1-4	1	1	8	1		
5-9	1	2	12	4		
10-14	0	13	6	2		
15-19	1	273	6	6		
20-24	1	383	12	9		
25-29	2	475	15	9		
30-34	4	457	20	9		
35-39	3	325	19	9		
40-44	2	247	21	10		
45-49	1	228	26	13		
50-54	1	221	39	16		
55-59	1	199	62	20		
60-64	1	192	102	27		
65-69	1	183	150	34		
70-74	1	143	186	40		
75-79	1	99	232	41		
80-84	1	69	228	44		
85-89	1	43	245	33		
90-	1	26	226	42		

*Tabelle A 8: Augenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte: Behandlungsraten  
nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Augenärzte Anteil Personen mit Beh.		HNO-Ärzte Anteil Personen mit Beh.		Hautärzte Anteil Personen mit Beh.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	10,6%	10,1%	11,5%	8,9%	6,6%	6,5%
1-4	21,6%	21,5%	21,7%	17,8%	10,1%	10,5%
5-9	30,8%	31,5%	25,5%	22,6%	13,0%	14,0%
10-14	25,4%	29,5%	13,7%	13,4%	14,5%	19,0%
15-19	17,2%	23,3%	11,7%	14,7%	17,1%	24,0%
20-24	9,4%	15,5%	10,7%	14,5%	13,8%	23,0%
25-29	9,5%	14,8%	10,9%	15,2%	13,6%	23,0%
30-34	10,0%	15,2%	12,1%	16,3%	12,7%	21,8%
35-39	10,8%	16,3%	12,3%	16,2%	12,0%	20,8%
40-44	13,7%	20,7%	12,6%	15,2%	11,8%	19,6%
45-49	19,0%	25,1%	12,8%	15,1%	11,7%	18,6%
50-54	20,8%	26,3%	13,8%	16,2%	12,4%	18,6%
55-59	24,2%	30,5%	16,3%	18,0%	14,4%	19,7%
60-64	30,7%	38,2%	19,0%	19,6%	17,7%	22,2%
65-69	39,4%	46,6%	20,7%	21,1%	21,0%	23,4%
70-74	47,0%	51,6%	22,6%	22,0%	22,4%	21,4%
75-79	51,1%	54,2%	25,3%	22,4%	22,5%	19,7%
80-84	51,8%	52,0%	25,5%	22,2%	23,6%	17,7%
85-89	48,1%	44,8%	27,5%	20,5%	23,3%	16,8%
90-	38,7%	32,4%	27,0%	21,1%	22,7%	14,5%

*Tabelle A 9: Augenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Augenärzte Kontakte je 100 Vers.		HNO-Ärzte Kontakte je 100 Vers.		Hautärzte Kontakte je 100 Vers.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	19	19	26	16	15	16
1-4	42	42	77	62	21	21
5-9	60	60	85	72	31	34
10-14	41	48	38	36	39	55
15-19	26	37	33	43	55	73
20-24	15	25	31	44	42	71
25-29	16	25	32	45	42	70
30-34	17	26	38	48	41	70
35-39	19	28	38	48	41	70
40-44	24	35	38	44	41	67
45-49	33	43	39	45	42	66
50-54	40	51	42	49	47	66
55-59	53	64	51	53	57	71
60-64	73	91	58	57	71	82
65-69	105	125	62	59	87	88
70-74	141	162	65	60	102	85
75-79	178	192	72	59	105	84
80-84	198	198	71	59	116	81
85-89	190	162	74	50	115	77
90-	148	104	70	44	136	69

*Tabelle A 10: Laborärzte, Pathologen, Radiologen und Nuklearmediziner:  
Behandlungsraten nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Laborärzte Anteil Personen mit Beh.		Pathologen Anteil Personen mit Beh.		Radiologen +Nuk. Anteil Personen mit Beh.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	31,4%	28,2%	0,3%	0,1%	3,0%	2,1%
1-4	16,0%	15,7%	2,0%	1,1%	2,6%	2,2%
5-9	12,4%	13,2%	1,9%	1,2%	3,0%	3,2%
10-14	11,3%	12,7%	1,2%	1,4%	4,9%	5,3%
15-19	9,8%	21,9%	2,5%	11,7%	7,3%	8,8%
20-24	9,4%	28,7%	2,8%	20,5%	8,6%	9,6%
25-29	10,5%	35,2%	3,2%	22,1%	9,1%	11,3%
30-34	11,9%	35,6%	3,6%	21,5%	10,3%	13,8%
35-39	12,6%	30,4%	4,0%	21,4%	11,5%	17,6%
40-44	13,5%	27,1%	4,4%	20,6%	13,1%	22,5%
45-49	15,0%	27,8%	5,2%	20,4%	14,8%	26,6%
50-54	17,6%	28,6%	6,0%	20,5%	17,1%	33,2%
55-59	20,8%	29,5%	8,8%	20,9%	20,4%	35,5%
60-64	25,2%	30,7%	10,7%	20,6%	22,0%	37,8%
65-69	29,3%	31,8%	11,8%	19,8%	22,8%	38,2%
70-74	32,5%	31,4%	11,8%	15,9%	24,5%	33,3%
75-79	34,7%	29,4%	11,4%	12,0%	24,8%	28,9%
80-84	33,9%	27,1%	9,8%	8,8%	21,3%	21,5%
85-89	32,1%	25,2%	7,6%	5,5%	18,2%	15,4%
90-	22,9%	18,4%	5,1%	2,1%	10,3%	7,4%

*Tabelle A 11: Laborärzte, Pathologen, Radiologen und Nuklearmediziner:  
Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Laborärzte Kontakte je 100 Vers.		Pathologen Kontakte je 100 Vers.		Radiologen +Nuk. Kontakte je 100 Vers.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	47	37	0	0	3	3
1-4	26	26	2	1	3	3
5-9	19	20	2	1	4	4
10-14	17	19	1	1	6	7
15-19	15	36	3	14	10	11
20-24	15	55	3	26	11	13
25-29	17	78	4	29	12	16
30-34	21	81	4	27	15	21
35-39	22	61	4	27	17	28
40-44	24	50	5	26	20	38
45-49	27	51	6	26	25	49
50-54	33	54	7	25	30	65
55-59	41	57	10	26	41	74
60-64	54	62	13	25	46	83
65-69	65	67	14	24	52	86
70-74	77	67	15	20	63	74
75-79	87	64	14	15	62	66
80-84	82	57	12	11	49	46
85-89	78	51	10	7	40	32
90-	48	32	6	2	22	14

*Tabelle A 12: Orthopäden, Chirurgen: Behandlungsraten  
nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Orthopäden Anteil Personen mit Beh.		Chirurgen Anteil Personen mit Beh.			
	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
0	29,5%	31,1%	5,2%	3,8%		
1-4	8,7%	9,1%	8,5%	4,9%		
5-9	10,1%	9,6%	9,3%	6,9%		
10-14	15,1%	15,3%	12,9%	11,1%		
15-19	14,3%	16,0%	15,4%	13,0%		
20-24	11,9%	13,7%	13,6%	10,6%		
25-29	12,2%	14,6%	11,8%	10,1%		
30-34	13,4%	16,0%	11,6%	10,5%		
35-39	14,6%	18,1%	12,0%	12,1%		
40-44	16,4%	20,7%	12,6%	12,9%		
45-49	17,9%	23,4%	13,3%	14,1%		
50-54	19,9%	27,5%	14,2%	15,8%		
55-59	23,5%	30,7%	15,7%	17,3%		
60-64	24,3%	32,0%	16,1%	17,6%		
65-69	23,3%	33,3%	15,9%	17,7%		
70-74	25,1%	34,2%	16,2%	17,7%		
75-79	24,4%	32,1%	17,0%	17,1%		
80-84	21,6%	25,9%	15,2%	14,7%		
85-89	18,1%	20,5%	14,9%	14,0%		
90-	11,2%	9,8%	9,7%	10,4%		

*Tabelle A 13: Orthopäden, Chirurgen: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Orthopäden Kontakte je 100 Vers.		Chirurgen Kontakte je 100 Vers.			
	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
0	62	76	12	7		
1-4	17	18	21	11		
5-9	21	19	25	17		
10-14	35	37	35	30		
15-19	39	45	48	38		
20-24	37	43	45	32		
25-29	41	49	41	32		
30-34	50	58	43	35		
35-39	58	71	46	43		
40-44	70	90	50	50		
45-49	84	111	55	58		
50-54	102	146	61	68		
55-59	134	179	71	77		
60-64	137	188	71	78		
65-69	128	211	68	78		
70-74	146	228	70	80		
75-79	146	232	72	79		
80-84	130	170	68	67		
85-89	104	129	75	53		
90-	45	44	39	42		



*Tabelle A 14: Nervenärzte, Psychotherapeuten: Behandlungsraten  
nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Nervenärzte Anteil Personen mit Beh.		Psychotherapeuten Anteil Personen mit Beh.			
	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
0	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%		
1-4	0,8%	0,6%	0,2%	0,2%		
5-9	5,3%	2,8%	1,7%	1,1%		
10-14	6,1%	3,5%	2,2%	1,4%		
15-19	3,4%	4,7%	1,0%	2,0%		
20-24	3,6%	6,0%	1,2%	3,1%		
25-29	4,5%	6,8%	1,4%	4,5%		
30-34	5,1%	7,2%	1,6%	4,4%		
35-39	5,3%	8,1%	1,6%	4,3%		
40-44	6,3%	9,3%	1,7%	4,3%		
45-49	7,3%	10,7%	1,7%	3,9%		
50-54	8,8%	12,3%	1,5%	3,5%		
55-59	11,1%	14,0%	1,4%	2,8%		
60-64	10,3%	12,8%	0,7%	1,5%		
65-69	10,2%	13,7%	0,3%	0,9%		
70-74	12,4%	15,2%	0,3%	0,6%		
75-79	14,6%	15,9%	0,1%	0,3%		
80-84	15,3%	15,4%	0,1%	0,3%		
85-89	16,1%	15,9%	0,2%	0,1%		
90-	11,2%	14,1%	0,2%	0,4%		

*Tabelle A 15: Nervenärzte, Psychotherapeuten: Arztkontakte je 100 Versicherte nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Nervenärzte Kontakte je 100 Vers.		Psychotherapeuten Kontakte je 100 Vers.		Kontakte je 100 Vers.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	1	0	0	0		
1-4	3	2	1	2		
5-9	42	19	26	16		
10-14	44	22	35	22		
15-19	17	20	13	29		
20-24	17	25	13	41		
25-29	25	33	20	67		
30-34	26	36	22	65		
35-39	26	41	22	63		
40-44	32	45	24	62		
45-49	36	53	22	55		
50-54	43	62	18	49		
55-59	54	66	17	35		
60-64	46	57	9	19		
65-69	45	63	3	9		
70-74	58	69	3	6		
75-79	70	86	1	3		
80-84	78	83	1	1		
85-89	98	113	2	1		
90-	76	127	0	2		

Tabelle A 16: Anteil der Bevölkerung mit Diagnosen aus der ambulanten Versorgung nach Diagnosekapiteln 2006 (stand.D2005)

	ICD10-Kapitel	Männer Anteil	Frauen Anteil	gesamt Anteil
01	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25,1%	31,0%	28,1%
02	Neubildungen	14,0%	21,6%	17,9%
03	Krankh. des Blutes und der blutbildenden Organe	5,4%	8,6%	7,1%
04	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankh.	30,6%	43,4%	37,1%
05	Psychische und Verhaltensstörungen	21,9%	33,7%	27,9%
06	Krankheiten des Nervensystems	14,0%	21,1%	17,7%
07	Krankh. des Auges und der Augenanhangsgebilde	25,9%	33,4%	29,7%
08	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17,1%	18,6%	17,9%
09	Krankheiten des Kreislaufsystems	34,0%	42,7%	38,4%
10	Krankheiten des Atmungssystems	44,8%	48,3%	46,6%
11	Krankheiten des Verdauungssystems	29,9%	32,9%	31,5%
12	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24,1%	32,7%	28,5%
13	Krankh. des Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	43,6%	52,3%	48,1%
14	Krankheiten des Urogenitalsystems	18,4%	55,4%	37,3%
15	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0%	3,8%	1,9%
16	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,7%	0,7%	0,7%
17	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	9,5%	11,3%	10,4%
18	Symptome und abnorme klin. und Laborbefunde	34,0%	48,4%	41,4%
19	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	28,6%	30,2%	29,4%
21	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen	38,7%	71,6%	55,5%

Tabelle A 17: Rückenschmerzen (M54): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006

Alter	Diagnoserate		Anzahl Betroffene	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	1,1%	0,8%	3.829	2.794
1-4	0,5%	0,5%	7.969	6.533
5-9	1,3%	1,4%	27.430	28.003
10-14	3,8%	4,6%	82.425	93.300
15-19	9,4%	13,1%	231.666	306.143
20-24	13,4%	18,0%	330.863	432.966
25-29	16,1%	21,7%	390.962	513.908
30-34	20,0%	25,7%	523.720	649.420
35-39	22,1%	28,0%	772.040	929.819
40-44	24,3%	31,1%	891.337	1.085.100
45-49	27,0%	34,2%	857.626	1.052.291
50-54	29,5%	37,6%	824.793	1.053.754
55-59	34,0%	39,7%	792.691	930.446
60-64	33,8%	39,6%	818.846	992.730
65-69	31,7%	40,5%	799.258	1.117.661
70-74	33,0%	40,5%	550.870	816.377
75-79	33,1%	39,9%	400.862	726.726
80-84	31,1%	36,3%	202.714	543.568
85-89	30,4%	31,1%	67.332	196.477
90-	24,4%	22,4%	34.337	105.924
	<b>21,3%</b>	<b>27,5%</b>	<b>8.611.570</b>	<b>11.583.940</b>
	<b>beide:</b>	<b>24,5%</b>		<b>20.195.510</b>

*Tabelle A 18: Hypertonie (I10): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Diagnoserate		Anzahl Betroffene	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	0,3%	0,2%	957	698
1-4	0,1%	0,1%	1.881	988
5-9	0,1%	0,1%	2.502	2.129
10-14	0,4%	0,3%	8.076	5.777
15-19	1,6%	1,0%	39.567	22.550
20-24	2,7%	1,9%	66.745	45.513
25-29	3,8%	2,9%	91.902	67.732
30-34	5,8%	4,0%	152.969	100.274
35-39	9,2%	6,2%	322.323	205.433
40-44	13,4%	10,6%	492.774	370.989
45-49	20,7%	18,1%	658.567	556.999
50-54	30,4%	28,9%	851.822	809.321
55-59	41,4%	39,6%	964.936	929.186
60-64	49,9%	48,0%	1.209.559	1.204.330
65-69	56,3%	56,6%	1.420.175	1.562.437
70-74	63,2%	65,5%	1.053.316	1.321.363
75-79	68,2%	71,4%	826.461	1.298.292
80-84	67,8%	73,2%	442.049	1.097.059
85-89	67,4%	71,5%	149.254	452.281
90-	60,4%	67,7%	85.037	319.792
	<b>21,9%</b>	<b>24,6%</b>	<b>8.840.871</b>	<b>10.373.143</b>
	<b>beide:</b>	<b>23,3%</b>		<b>19.214.014</b>

Tabelle A 19: Refraktionsfehler (H52): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006

Alter	Diagnoserate		Anzahl Betroffene	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	2,4%	2,3%	8.616	7.916
1-4	11,9%	11,9%	177.743	169.024
5-9	23,4%	24,3%	476.598	470.033
10-14	20,7%	24,5%	446.877	501.436
15-19	14,3%	19,5%	352.249	457.371
20-24	7,0%	12,6%	172.811	301.424
25-29	6,9%	11,7%	167.483	277.691
30-34	6,8%	11,9%	177.925	299.889
35-39	7,4%	12,9%	259.505	428.661
40-44	10,2%	17,1%	374.942	595.373
45-49	15,8%	22,0%	501.431	676.577
50-54	17,6%	23,0%	492.296	645.071
55-59	20,6%	26,5%	480.694	620.958
60-64	26,0%	32,7%	631.317	821.521
65-69	33,1%	39,7%	833.284	1.096.106
70-74	39,5%	43,2%	658.243	871.504
75-79	42,2%	44,9%	511.492	817.481
80-84	42,1%	42,1%	274.408	631.774
85-89	37,8%	34,5%	83.655	218.132
90-	29,9%	22,8%	42.116	107.541
	<b>17,7%</b>	<b>23,8%</b>	<b>7.123.683</b>	<b>10.015.483</b>
	<b>beide:</b>	<b>20,8%</b>		<b>17.139.166</b>

Tabelle A 20: Krebsvorsorge (Z12): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006

Alter	Diagnoserate		Anzahl Betroffene	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	0,5%	0,2%	1.915	698
1-4	0,3%	0,3%	4.759	4.666
5-9	0,1%	0,1%	2.687	2.453
10-14	0,2%	0,3%	3.554	6.189
15-19	0,3%	7,1%	7.170	167.330
20-24	0,3%	49,4%	8.371	1.186.945
25-29	0,4%	55,4%	8.667	1.309.154
30-34	0,3%	53,7%	8.805	1.357.115
35-39	0,5%	52,3%	16.653	1.735.283
40-44	0,7%	50,6%	26.035	1.766.618
45-49	5,1%	49,6%	163.509	1.527.410
50-54	8,0%	48,5%	222.598	1.358.228
55-59	10,8%	46,0%	252.591	1.078.679
60-64	13,8%	45,8%	334.639	1.148.994
65-69	15,9%	43,9%	401.744	1.212.766
70-74	15,7%	32,9%	261.960	664.517
75-79	14,4%	22,3%	174.176	406.244
80-84	10,7%	12,9%	70.051	193.391
85-89	7,8%	6,9%	17.241	43.536
90-	3,8%	3,2%	5.365	14.959
	<b>4,9%</b>	<b>36,1%</b>	<b>1.992.491</b>	<b>15.185.175</b>
	<b>beide:</b>	<b>20,8%</b>		<b>17.177.666</b>

*Tabelle A 21: Lipidämie (E78): Diagnoseraten und Anzahl Betroffene nach Geschlecht und Alter 2006*

Alter	Diagnoserate		Anzahl Betroffene	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
0	0,1%	0,1%	239	233
1-4	0,1%	0,1%	1.439	1.098
5-9	0,3%	0,3%	7.043	6.063
10-14	1,0%	1,0%	21.922	20.723
15-19	1,0%	1,6%	23.704	37.028
20-24	1,2%	2,3%	29.408	55.704
25-29	2,3%	3,0%	55.434	71.325
30-34	4,5%	3,9%	118.999	99.749
35-39	8,7%	6,3%	302.664	207.592
40-44	13,7%	9,0%	501.162	313.620
45-49	19,4%	13,2%	618.294	405.791
50-54	25,9%	20,6%	724.399	577.096
55-59	32,2%	28,7%	749.424	672.809
60-64	38,6%	37,4%	936.270	938.057
65-69	44,0%	44,3%	1.109.410	1.222.674
70-74	46,9%	49,4%	782.254	997.230
75-79	46,5%	50,3%	563.634	915.469
80-84	41,6%	45,1%	271.316	676.318
85-89	34,6%	38,0%	76.616	240.013
90-	24,4%	24,9%	34.337	117.648
	<b>17,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>6.927.967</b>	<b>7.576.240</b>
	<b>beide:</b>	<b>17,6%</b>		<b>14.504.207</b>



Tabelle A 22: Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	192,6	206,2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1-4	314,9	253,3	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
5-9	393,3	259,2	1,8%	1,8%	3,2%	3,1%
10-14	230,2	152,2	3,6%	3,6%	10,4%	8,8%
15-19	131,3	204,1	3,1%	4,4%	9,3%	9,5%
20-24	127,6	274,8	4,1%	5,7%	9,5%	13,1%
25-29	135,3	314,3	5,6%	7,3%	12,7%	17,6%
30-34	144,7	319,8	5,2%	6,7%	13,9%	18,0%
35-39	151,0	321,8	5,0%	6,5%	14,5%	18,4%
40-44	171,1	331,5	4,9%	6,3%	14,3%	18,5%
45-49	202,8	357,6	3,9%	5,4%	12,0%	16,5%
50-54	233,0	384,7	3,0%	4,5%	10,0%	13,6%
55-59	272,9	403,1	2,3%	3,2%	8,2%	11,1%
60-64	282,3	392,0	1,1%	1,8%	5,0%	7,2%
65-69	267,4	382,0	0,5%	0,9%	2,4%	4,1%
70-74	283,4	403,4	0,3%	0,5%	1,3%	2,6%
75-79	304,4	417,3	0,1%	0,2%	0,6%	0,8%
80-84	341,5	458,1	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%
85-89	403,2	511,2	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
90-	434,3	635,3	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ges.	<b>219,2</b>	<b>337,2</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>7,4%</b>	<b>10,1%</b>
	<b>beide:</b>	<b>279,5</b>		<b>3,1%</b>		<b>9,1%</b>

*Tabelle A 23: Affektive Störungen (F30-F39): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	1,3	3,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	2,6	2,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	5,1	4,5	7,1%	9,0%	10,2%	13,8%
10-14	9,2	8,8	9,1%	7,4%	21,0%	17,1%
15-19	14,6	32,6	10,0%	12,9%	18,8%	21,1%
20-24	29,2	67,3	10,7%	15,5%	22,0%	29,7%
25-29	38,0	93,3	12,4%	17,3%	25,8%	35,3%
30-34	43,7	104,8	11,9%	15,0%	28,2%	34,0%
35-39	47,3	116,6	11,6%	13,3%	28,3%	32,4%
40-44	55,3	132,4	11,2%	12,5%	28,1%	31,8%
45-49	66,1	153,7	9,6%	10,0%	24,8%	27,6%
50-54	80,4	180,6	7,1%	8,1%	20,7%	22,4%
55-59	100,9	202,2	5,2%	5,6%	16,6%	17,5%
60-64	96,3	196,5	2,5%	2,9%	10,2%	11,2%
65-69	80,3	195,2	1,2%	1,5%	5,5%	6,3%
70-74	87,1	216,4	0,9%	0,7%	3,2%	3,8%
75-79	105,5	235,0	0,1%	0,2%	1,5%	1,0%
80-84	125,3	251,8	0,0%	0,1%	0,2%	0,5%
85-89	141,5	255,4	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%
90-	118,1	253,4	n.a.	0,3%	n.a.	0,3%
ges.	<b>55,2</b>	<b>133,2</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,5%</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,9%</b>
	<b>beide:</b>	<b>95,0</b>		<b>6,4%</b>		<b>16,8%</b>

Tabelle A 24: Depressionen (F32-F33): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	0,6	0,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	2,6	2,6	7,0%	8,2%	10,4%	12,7%
10-14	6,8	7,1	9,5%	8,5%	21,2%	18,3%
15-19	13,0	30,4	10,5%	12,8%	18,6%	20,8%
20-24	27,1	62,7	10,6%	15,4%	21,9%	29,5%
25-29	35,3	87,5	12,2%	17,1%	25,7%	34,7%
30-34	40,8	99,1	11,9%	14,7%	27,9%	33,3%
35-39	44,0	110,8	11,4%	13,2%	27,9%	31,7%
40-44	51,7	126,4	11,0%	12,4%	27,8%	31,3%
45-49	62,1	147,1	9,6%	10,0%	24,6%	27,5%
50-54	76,1	173,6	7,1%	8,1%	20,7%	22,4%
55-59	95,4	194,6	5,2%	5,6%	16,7%	17,5%
60-64	91,7	189,9	2,5%	3,0%	10,2%	11,2%
65-69	76,3	187,7	1,2%	1,5%	5,6%	6,2%
70-74	82,7	210,8	0,9%	0,7%	3,3%	3,8%
75-79	100,1	226,5	0,2%	0,3%	1,5%	1,0%
80-84	121,3	244,9	0,0%	0,1%	0,2%	0,5%
85-89	135,9	246,9	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%
90-	114,3	244,9	n.a.	0,3%	n.a.	0,3%
ges.	<b>51,7</b>	<b>127,6</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>16,4%</b>	<b>16,6%</b>
	<b>beide:</b>	<b>90,5</b>		<b>6,4%</b>		<b>16,6%</b>

*Tabelle A 25: Depressive Episode (F32): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	0,4	0,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	2,4	2,4	6,7%	n.a.	10,5%	n.a.
10-14	6,5	6,6	9,2%	7,8%	20,1%	17,9%
15-19	12,0	28,3	10,9%	12,5%	18,7%	20,0%
20-24	24,6	57,5	10,4%	15,1%	21,0%	28,7%
25-29	32,0	80,6	12,4%	16,9%	25,5%	34,0%
30-34	36,7	91,1	12,1%	14,9%	27,5%	33,1%
35-39	39,4	100,5	11,5%	13,2%	28,1%	31,5%
40-44	46,1	114,3	11,2%	12,5%	27,5%	31,0%
45-49	55,2	133,4	9,8%	10,2%	24,5%	27,2%
50-54	66,9	157,8	7,3%	8,2%	20,7%	22,5%
55-59	84,5	174,5	5,4%	5,6%	17,0%	17,6%
60-64	79,8	168,9	2,6%	3,2%	10,4%	11,4%
65-69	65,0	167,0	1,1%	1,6%	5,8%	6,5%
70-74	70,5	185,5	1,0%	0,7%	3,3%	3,9%
75-79	87,2	200,0	0,2%	0,3%	1,6%	1,0%
80-84	106,5	214,8	0,0%	0,1%	0,3%	0,6%
85-89	120,7	216,6	0,0%	0,2%	0,4%	0,3%
90-	97,1	215,8	n.a.	0,4%	n.a.	0,4%
ges.	<b>45,6</b>	<b>114,5</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,6%</b>	<b>16,5%</b>	<b>16,8%</b>
	<b>beide:</b>	<b>80,8</b>		<b>6,5%</b>		<b>16,7%</b>

*Tabelle A 26: Rezidivierende depressive Störung (F33): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	0,1	0,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	0,3	0,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10-14	0,3	0,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15-19	1,4	3,6	n.a.	21,6%	n.a.	32,6%
20-24	4,5	10,3	19,1%	26,5%	38,2%	46,4%
25-29	6,4	15,2	18,8%	30,6%	37,5%	54,8%
30-34	8,1	17,9	17,6%	20,1%	40,4%	47,0%
35-39	8,8	21,7	17,0%	21,2%	38,2%	45,5%
40-44	11,1	26,7	16,5%	18,3%	39,8%	44,5%
45-49	14,1	31,1	12,9%	16,0%	34,2%	40,9%
50-54	18,0	37,8	10,7%	12,2%	29,8%	33,1%
55-59	23,8	45,2	8,1%	9,5%	24,6%	26,7%
60-64	21,7	43,6	4,3%	5,1%	14,7%	16,8%
65-69	18,3	41,1	2,1%	2,6%	8,4%	10,8%
70-74	18,6	47,6	1,6%	1,5%	5,5%	5,4%
75-79	19,7	52,8	0,8%	0,4%	1,9%	1,4%
80-84	25,5	51,0	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%
85-89	24,4	51,0	n.a.	0,7%	n.a.	0,7%
90-	21,0	49,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>11,2</b>	<b>27,0</b>	<b>9,0%</b>	<b>9,7%</b>	<b>23,3%</b>	<b>23,8%</b>
	<b>beide:</b>	<b>19,3</b>		<b>9,5%</b>		<b>23,7%</b>

Tabelle A 27: Anhaltende affektive Störung (F34): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,7	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	0,1	0,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	0,5	0,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10-14	0,8	0,6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15-19	1,2	2,6	n.a.	24,1%	n.a.	34,0%
20-24	2,9	7,0	20,5%	24,7%	36,4%	45,6%
25-29	4,1	10,3	26,4%	30,9%	42,1%	59,0%
30-34	4,8	11,4	23,5%	27,4%	44,0%	59,3%
35-39	5,4	11,6	22,7%	27,4%	46,7%	58,8%
40-44	6,0	13,1	23,2%	22,3%	47,0%	54,8%
45-49	7,4	15,0	18,3%	19,1%	42,3%	49,2%
50-54	9,6	17,0	16,5%	14,9%	36,0%	37,8%
55-59	11,9	18,3	9,4%	12,3%	27,8%	32,6%
60-64	9,1	15,6	5,2%	8,5%	15,0%	22,8%
65-69	6,2	15,5	3,5%	4,5%	11,7%	11,2%
70-74	6,1	13,9	2,1%	2,8%	4,2%	9,3%
75-79	7,5	16,4	n.a.	1,7%	n.a.	5,8%
80-84	6,4	14,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	7,4	12,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	1,9	11,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>5,4</b>	<b>11,3</b>	<b>13,9%</b>	<b>14,7%</b>	<b>30,3%</b>	<b>34,3%</b>
	<b>beide:</b>	<b>8,4</b>		<b>14,4%</b>		<b>33,0%</b>

*Tabelle A 28: Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48):  
Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	30,2	35,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	29,4	28,3	0,8%	0,1%	0,8%	0,5%
5-9	52,3	46,7	5,8%	5,1%	9,0%	8,0%
10-14	54,3	58,5	6,9%	5,3%	15,4%	11,5%
15-19	50,6	128,0	5,3%	5,5%	12,2%	10,6%
20-24	68,8	194,2	5,9%	6,5%	12,4%	14,2%
25-29	77,6	231,9	7,8%	8,3%	16,0%	18,9%
30-34	83,7	238,3	7,2%	7,5%	17,3%	19,0%
35-39	86,7	233,8	6,7%	7,6%	18,3%	20,1%
40-44	92,3	238,0	7,2%	7,5%	18,7%	20,4%
45-49	103,1	249,4	5,9%	6,6%	16,6%	18,6%
50-54	111,2	258,0	5,1%	5,8%	15,1%	16,0%
55-59	128,4	267,2	3,9%	4,2%	12,3%	13,0%
60-64	116,0	247,5	2,2%	2,5%	7,7%	8,6%
65-69	101,3	235,4	1,0%	1,3%	4,3%	5,2%
70-74	103,3	232,5	0,5%	0,7%	2,2%	3,3%
75-79	105,6	206,8	0,2%	0,3%	1,0%	1,3%
80-84	110,8	174,6	0,0%	0,2%	0,1%	0,8%
85-89	107,4	141,6	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%
90-	87,6	95,0	n.a.	0,9%	n.a.	0,9%
ges.	<b>86,9</b>	<b>199,8</b>	<b>4,7%</b>	<b>5,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>13,2%</b>
	<b>beide:</b>	<b>144,6</b>		<b>4,9%</b>		<b>12,9%</b>

Tabelle A 29: Phobische Störung (F40): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	1,8	1,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	2,6	2,7	6,1%	3,5%	7,0%	5,3%
10-14	3,5	3,4	12,3%	9,3%	22,7%	16,7%
15-19	4,1	10,4	13,4%	12,3%	22,3%	20,8%
20-24	5,1	17,6	21,3%	15,9%	36,5%	29,3%
25-29	5,8	21,2	22,1%	15,0%	43,4%	32,1%
30-34	5,8	19,1	18,4%	12,8%	44,7%	29,0%
35-39	5,3	19,5	17,8%	12,1%	44,1%	27,7%
40-44	4,9	19,1	16,4%	12,3%	35,4%	25,6%
45-49	5,1	21,5	12,8%	9,0%	32,5%	21,5%
50-54	5,0	22,2	16,2%	6,2%	32,0%	17,4%
55-59	6,0	22,7	10,8%	6,2%	29,7%	16,4%
60-64	5,2	21,0	5,3%	3,1%	13,4%	9,2%
65-69	4,6	20,9	2,6%	2,0%	5,8%	6,4%
70-74	3,6	19,4	n.a.	2,0%	n.a.	4,7%
75-79	4,0	11,9	n.a.	0,0%	n.a.	0,0%
80-84	3,6	10,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	6,0	4,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	0,0	3,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>4,6</b>	<b>16,2</b>	<b>13,0%</b>	<b>8,3%</b>	<b>28,4%</b>	<b>18,8%</b>
	<b>beide:</b>	<b>10,6</b>		<b>9,3%</b>		<b>20,9%</b>



Tabelle A 30: Andere Angststörungen (F41): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,0	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	6,0	6,9	1,2%	0,6%	1,2%	0,6%
5-9	9,4	9,8	8,9%	8,1%	12,0%	11,8%
10-14	9,6	10,5	10,3%	9,6%	18,3%	19,0%
15-19	8,0	22,7	10,2%	11,3%	20,7%	18,3%
20-24	11,7	40,1	11,7%	14,0%	24,7%	27,0%
25-29	15,9	55,5	17,3%	16,4%	33,2%	33,3%
30-34	18,1	57,6	13,1%	13,3%	32,7%	31,3%
35-39	18,1	52,9	13,4%	14,5%	34,7%	35,7%
40-44	19,5	51,5	14,1%	13,7%	35,0%	35,5%
45-49	21,3	54,7	10,8%	12,1%	31,0%	31,7%
50-54	24,8	58,3	9,7%	10,3%	26,9%	27,8%
55-59	27,4	59,8	7,0%	7,0%	23,0%	22,6%
60-64	22,7	56,1	4,6%	5,6%	15,0%	16,5%
65-69	18,7	52,9	2,5%	2,6%	9,0%	10,3%
70-74	19,9	53,1	1,3%	0,7%	4,3%	4,4%
75-79	19,4	50,6	0,4%	0,9%	1,6%	2,2%
80-84	21,6	44,1	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
85-89	16,6	41,0	n.a.	0,0%	n.a.	0,0%
90-	17,1	24,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>17,3</b>	<b>44,9</b>	<b>9,1%</b>	<b>9,2%</b>	<b>23,1%</b>	<b>22,9%</b>
	<b>beide:</b>	<b>31,4</b>		<b>9,2%</b>		<b>23,0%</b>

*Tabelle A 31: Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen  
(F43): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psycho-  
therapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	17,4	19,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	8,6	7,5	2,2%	0,5%	2,2%	1,6%
5-9	19,6	15,7	8,7%	8,7%	12,9%	14,0%
10-14	21,4	18,9	8,9%	9,4%	18,6%	19,0%
15-19	16,5	37,3	8,3%	10,3%	16,5%	17,5%
20-24	21,7	58,1	8,2%	11,0%	15,5%	20,6%
25-29	23,1	70,5	10,9%	14,0%	18,8%	26,7%
30-34	24,4	70,4	12,3%	13,4%	23,9%	27,9%
35-39	25,6	71,0	11,3%	13,4%	23,3%	29,1%
40-44	27,3	73,2	12,9%	14,3%	26,3%	30,6%
45-49	29,0	72,7	10,7%	13,1%	23,1%	28,3%
50-54	32,0	73,1	9,5%	10,9%	22,1%	24,7%
55-59	33,5	70,0	8,1%	8,4%	18,9%	21,3%
60-64	26,1	54,5	5,1%	5,9%	12,3%	14,0%
65-69	16,5	48,2	2,4%	3,2%	7,7%	9,1%
70-74	17,0	49,2	1,3%	1,6%	3,8%	5,6%
75-79	18,5	42,2	0,4%	0,7%	2,0%	2,5%
80-84	21,5	35,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
85-89	25,8	31,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	22,9	15,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>23,5</b>	<b>53,8</b>	<b>8,7%</b>	<b>9,9%</b>	<b>18,0%</b>	<b>21,4%</b>
	<b>beide:</b>	<b>39,0</b>		<b>9,6%</b>		<b>20,4%</b>

Tabelle A 32: Somatoforme Störungen (F45): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	6,0	9,6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	9,4	9,1	0,8%	0,0%	0,8%	0,0%
5-9	18,7	18,9	3,2%	2,0%	5,1%	2,9%
10-14	19,5	27,5	3,6%	2,6%	8,3%	5,7%
15-19	22,3	72,3	3,3%	3,6%	7,2%	7,4%
20-24	33,7	105,8	4,2%	5,0%	9,1%	11,4%
25-29	36,8	125,5	5,5%	6,8%	11,7%	16,5%
30-34	42,7	131,1	5,4%	6,3%	12,3%	15,9%
35-39	44,7	127,5	4,6%	6,2%	13,9%	16,8%
40-44	48,6	132,8	5,6%	6,2%	14,9%	18,1%
45-49	55,8	144,2	4,9%	5,6%	14,5%	17,0%
50-54	60,2	150,4	4,5%	5,4%	13,9%	15,3%
55-59	72,7	161,4	3,2%	3,8%	11,0%	11,9%
60-64	68,7	154,3	1,8%	2,3%	6,7%	8,4%
65-69	64,6	148,3	0,7%	0,9%	3,3%	4,8%
70-74	67,0	143,4	0,4%	0,6%	2,3%	3,1%
75-79	66,3	118,5	0,1%	0,2%	0,9%	1,4%
80-84	66,5	95,3	0,0%	0,2%	0,0%	0,6%
85-89	62,7	72,1	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
90-	49,5	53,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>46,4</b>	<b>114,1</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,0%</b>	<b>9,5%</b>	<b>11,5%</b>
	<b>beide:</b>	<b>81,0</b>		<b>3,8%</b>		<b>10,9%</b>

Tabelle A 33: Andere neurotische Störungen (F48): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	6,7	5,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	3,9	3,2	0,0%	n.a.	0,0%	n.a.
5-9	4,1	2,5	9,3%	7,6%	17,6%	13,3%
10-14	4,8	4,8	8,5%	5,6%	22,9%	14,9%
15-19	6,2	12,1	5,8%	8,8%	13,4%	14,2%
20-24	10,5	24,8	7,2%	7,2%	11,6%	14,3%
25-29	13,9	32,5	5,8%	10,0%	11,6%	20,4%
30-34	13,7	37,6	7,7%	9,2%	15,6%	21,0%
35-39	15,2	38,5	6,1%	8,4%	16,3%	22,0%
40-44	16,1	39,8	8,9%	10,3%	20,4%	24,8%
45-49	17,3	40,4	6,5%	8,4%	15,2%	22,1%
50-54	19,1	39,2	5,7%	8,3%	15,0%	20,0%
55-59	21,2	39,4	3,5%	5,7%	10,8%	15,7%
60-64	16,3	31,1	1,8%	3,5%	7,7%	11,4%
65-69	12,1	27,0	1,2%	1,8%	5,6%	6,2%
70-74	11,0	25,6	0,0%	0,8%	1,9%	3,5%
75-79	12,8	27,0	0,6%	0,4%	0,6%	1,1%
80-84	13,8	21,9	n.a.	0,7%	n.a.	0,7%
85-89	12,0	16,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	7,6	12,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>13,0</b>	<b>27,9</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,7%</b>	<b>12,6%</b>	<b>16,4%</b>
	<b>beide:</b>	<b>20,6</b>		<b>6,3%</b>		<b>15,3%</b>

Tabelle A 34: Essstörungen (F50): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ...			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	17,4	20,6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	15,3	14,6	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%
5-9	4,3	5,0	2,6%	3,3%	3,7%	4,3%
10-14	3,8	6,5	5,1%	6,9%	11,8%	12,8%
15-19	1,8	12,7	n.a.	14,0%	n.a.	26,8%
20-24	1,2	15,8	n.a.	16,6%	n.a.	41,9%
25-29	1,2	13,8	n.a.	22,4%	n.a.	50,6%
30-34	0,8	11,1	n.a.	19,8%	n.a.	50,5%
35-39	0,6	7,4	n.a.	19,0%	n.a.	43,6%
40-44	0,6	5,7	n.a.	20,7%	n.a.	46,8%
45-49	0,7	4,6	n.a.	17,0%	n.a.	46,0%
50-54	0,4	3,1	n.a.	12,6%	n.a.	40,9%
55-59	0,7	2,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60-64	0,3	1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65-69	0,3	0,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70-74	0,3	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75-79	0,5	0,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80-84	0,7	0,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	0,5	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	1,9	6,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>1,8</b>	<b>6,3</b>	<b>4,3%</b>	<b>14,2%</b>	<b>9,8%</b>	<b>33,7%</b>
	<b>beide:</b>	<b>4,1</b>		<b>12,1%</b>		<b>28,7%</b>

*Tabelle A 35: Spezifische Persönlichkeitsstörungen (F60): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	0,0	0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	1,1	0,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5-9	2,5	1,7	3,6%	n.a.	7,1%	n.a.
10-14	2,7	2,5	8,0%	8,0%	19,2%	20,5%
15-19	3,7	7,1	12,4%	15,0%	21,8%	28,3%
20-24	6,2	12,5	12,7%	23,9%	30,4%	45,0%
25-29	7,1	12,8	18,2%	29,0%	34,1%	61,6%
30-34	7,3	12,5	21,5%	29,8%	43,1%	60,6%
35-39	6,9	10,7	18,8%	23,5%	46,7%	54,8%
40-44	7,3	10,8	21,8%	25,6%	48,8%	58,5%
45-49	6,9	10,2	16,5%	22,7%	44,2%	53,2%
50-54	6,8	9,4	12,3%	23,8%	37,6%	49,4%
55-59	7,2	8,7	10,9%	14,5%	28,8%	42,3%
60-64	4,7	6,9	7,9%	10,9%	24,2%	30,4%
65-69	3,3	5,1	0,7%	3,6%	12,4%	16,1%
70-74	3,3	4,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75-79	3,0	4,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80-84	4,4	3,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	6,0	5,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	3,8	3,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>5,3</b>	<b>7,8</b>	<b>14,0%</b>	<b>19,9%</b>	<b>33,6%</b>	<b>44,5%</b>
	<b>beide:</b>	<b>6,6</b>		<b>17,6%</b>		<b>40,2%</b>

*Tabelle A 36: Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	21,5	35,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	77,6	55,6	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%
5-9	192,6	100,9	3,3%	3,9%	5,7%	6,4%
10-14	149,2	66,5	4,6%	5,6%	13,1%	13,1%
15-19	49,2	24,0	3,7%	9,4%	13,3%	19,0%
20-24	10,1	6,2	3,3%	8,7%	14,8%	24,1%
25-29	4,8	3,9	7,3%	10,8%	18,0%	21,6%
30-34	4,0	4,7	5,4%	4,4%	17,2%	20,5%
35-39	3,5	4,3	6,9%	11,8%	20,2%	26,5%
40-44	3,5	4,7	9,5%	10,8%	23,3%	25,5%
45-49	3,0	5,0	6,0%	9,5%	17,6%	23,1%
50-54	2,6	4,9	5,2%	5,7%	16,7%	16,3%
55-59	3,5	4,5	4,8%	6,3%	9,6%	15,4%
60-64	3,1	4,9	3,2%	4,7%	4,8%	12,4%
65-69	3,8	4,8	0,6%	0,8%	3,8%	3,1%
70-74	3,5	5,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75-79	4,3	5,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80-84	6,1	4,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	5,5	5,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	11,4	11,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>27,1</b>	<b>15,3</b>	<b>3,6%</b>	<b>4,8%</b>	<b>9,1%</b>	<b>10,4%</b>
	<b>beide:</b>	<b>21,1</b>		<b>4,0%</b>		<b>9,6%</b>

*Tabelle A 37: Hyperkinetische Störungen (F90): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ....			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	2,0	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	16,2	5,3	0,5%	0,0%	0,9%	0,7%
5-9	96,2	34,9	3,2%	3,4%	5,9%	5,2%
10-14	93,0	27,0	3,7%	4,1%	12,4%	10,8%
15-19	29,7	7,3	2,4%	5,4%	12,4%	14,8%
20-24	4,5	1,4	2,5%	n.a.	17,7%	n.a.
25-29	1,6	0,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30-34	1,0	1,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35-39	1,0	1,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40-44	0,9	1,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45-49	0,7	0,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50-54	0,4	0,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55-59	0,5	0,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60-64	0,3	0,6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65-69	0,3	0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70-74	0,4	0,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75-79	0,5	0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80-84	0,7	0,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	0,0	0,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>13,1</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,9%</b>	<b>10,0%</b>	<b>11,6%</b>
	<b>beide:</b>	<b>8,5</b>		<b>3,7%</b>		<b>10,4%</b>



*Tabelle A 38: Störungen des Sozialverhaltens (F91): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie*

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ...			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	3,4	4,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	17,1	11,4	0,2%	0,7%	0,4%	1,0%
5-9	28,5	13,4	6,2%	8,4%	9,7%	11,6%
10-14	20,6	9,0	8,5%	5,7%	19,7%	14,7%
15-19	6,8	4,5	5,1%	10,5%	16,3%	18,1%
20-24	1,6	1,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25-29	0,9	1,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30-34	0,8	1,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35-39	0,7	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40-44	0,9	1,6	n.a.	12,7%	n.a.	23,0%
45-49	0,6	1,9	n.a.	7,7%	n.a.	18,5%
50-54	0,6	1,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55-59	0,5	1,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60-64	0,9	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65-69	0,7	1,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70-74	0,8	1,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75-79	1,5	1,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80-84	2,1	1,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	4,6	2,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	5,7	7,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>4,3</b>	<b>3,0</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,9%</b>
	<b>beide:</b>	<b>3,7</b>		<b>5,7%</b>		<b>11,8%</b>

Tabelle A 39: Emotionale Störungen des Kindesalters (F93): Diagnoseraten 2006 und Anteil Betroffene mit Hinweis auf Psychotherapie

Alter	Diagnoserate		Anteil Betroffene mit Genehmigung einer Psychotherapie ...			
	in 2006		in 2006		2000 bis 2006	
	Männer je 1.000	Frauen je 1.000	Männer %	Frauen %	Männer %	Frauen %
0	5,4	6,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1-4	14,3	13,0	1,6%	1,5%	2,3%	1,5%
5-9	31,0	24,0	9,7%	8,6%	14,4%	13,5%
10-14	26,5	19,5	10,3%	9,5%	24,1%	21,4%
15-19	4,9	5,6	9,7%	15,7%	26,4%	27,1%
20-24	0,2	0,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25-29	0,0	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30-34	0,1	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35-39	0,0	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40-44	0,1	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45-49	0,1	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50-54	0,0	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55-59	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60-64	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65-69	0,0	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70-74	0,1	0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75-79	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80-84	0,1	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85-89	0,0	0,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90-	0,0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ges.	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	<b>8,7%</b>	<b>8,6%</b>	<b>17,2%</b>	<b>15,7%</b>
	<b>beide:</b>	<b>3,4</b>		<b>8,6%</b>		<b>16,5%</b>

Tabelle A 40: Verteilung der AU-Fälle und -Tage nach Dauer der AU: 1996 - 2006

abgeschl. AU-Fälle	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1-3d Anteil Fälle [%]	32,4	33,4	33,2	32,3	33,1	33,8	34,7	35,4	35,8	35,1	36,8
4-7d Anteil Fälle [%]	28,7	28,3	28,2	29,0	28,3	28,1	28,0	28,4	28,1	29,5	28,3
7-14d Anteil Fälle [%]	19,7	19,6	19,6	20,2	19,5	18,9	18,3	18,0	17,6	18,1	17,2
15-28d An- teil Fälle [%]	10,5	10,7	10,9	10,7	10,9	10,9	10,6	10,1	10,2	9,7	9,9
29-36d An- teil Fälle [%]	4,2	3,6	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	3,6	3,3	3,4
>6 Wochen Anteil Fälle [%]	4,5	4,3	4,4	4,3	4,5	4,6	4,7	4,6	4,7	4,3	4,3
1-3d Anteil Tage [%]	4,8	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	5,8
4-7d Anteil Tage [%]	10,4	10,7	10,8	11,0	10,6	10,3	10,2	10,4	10,5	11,4	11,0
7-14d Anteil Tage [%]	14,6	15,3	15,4	15,8	15,0	14,3	13,8	13,6	13,6	14,4	13,8
15-28d An- teil Tage [%]	15,0	16,0	16,5	16,1	16,2	15,8	15,4	14,7	15,3	14,8	15,3
29-36d An- teil Tage [%]	10,3	9,3	9,5	9,2	9,4	9,3	9,1	8,9	9,3	8,9	9,2
>6 Wochen Anteil Tage [%]	45,0	43,6	42,7	43,0	43,9	45,4	46,4	47,1	45,9	45,1	44,8

*Tabelle A 41: Arbeitsunfähigkeitsbeginn nach Wochentagen: 2006*

AU-Beginn:	Anteil der AU-Fälle
Montag	33,0%
Dienstag	20,6%
Mittwoch	17,3%
Donnerstag	16,1%
Freitag	10,2%
Samstag	1,4%
Sonntag	1,4%

*Tabelle A 42: Verteilung der Arbeitsunfähigkeitstage auf Wochentage: 2006*

	AU-Tage	Anteil Tage
Montag	1.373.667	13,89%
Dienstag	1.475.399	14,92%
Mittwoch	1.538.418	15,55%
Donnerstag	1.547.843	15,65%
Freitag	1.569.921	15,87%
Samstag	1.214.245	12,28%
Sonntag	1.171.726	11,85%
Gesamtstage	9.891.219	100,00%

*Tabelle A 43: AU-Fälle nach Alter und Geschlecht: 2005, 2006*

Alter	Männer Fälle je VJ 2005	Frauen Fälle je VJ 2005	Männer Fälle je VJ 2006	Frauen Fälle je VJ 2006
15-25	1,48	1,54	1,44	1,50
25-30	0,97	1,07	0,94	1,08
30-35	0,95	0,97	0,92	0,96
35-40	0,97	1,00	0,93	0,97
40-45	0,98	1,02	0,94	0,99
45-50	0,99	1,03	0,95	1,02
50-55	1,04	1,11	1,01	1,08
55-65	1,11	1,10	1,06	1,06

*Tabelle A 44: AU-Tage nach Alter und Geschlecht: 2005, 2006*

Alter	Männer Tage je VJ 2005	Frauen Tage je VJ 2005	Männer Tage je VJ 2006	Frauen Tage je VJ 2006
15-25	10,23	9,63	9,60	9,41
25-30	9,13	9,67	8,63	9,29
30-35	9,85	9,66	9,35	9,85
35-40	10,75	11,35	10,36	11,12
40-45	12,20	13,10	11,59	12,71
45-50	14,67	15,48	13,96	15,20
50-55	18,27	19,18	17,33	18,99
55-65	25,17	23,48	23,14	22,37

Tabelle A 45: AU-Tage je Fall nach Alter und Geschlecht: 2005, 2006

Alter	Männer	Frauen	Männer	Frauen
	Tage je Fall 2005	Tage je Fall 2005	Tage je Fall 2006	Tage je Fall 2006
15-25	6,9	6,3	6,6	6,3
25-30	9,4	9,0	9,2	8,6
30-35	10,4	10,0	10,1	10,2
35-40	11,1	11,4	11,1	11,5
40-45	12,4	12,9	12,4	12,9
45-50	14,8	15,1	14,6	15,0
50-55	17,5	17,3	17,1	17,6
55-65	22,7	21,3	21,7	21,0

Tabelle A 46: AU-Fälle und AU-Tage je Versicherungsjahr nach Region: 1996 - 2006 (Erwerbstätige insgesamt; stand.)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AU-Fälle je VJ Alte BL	1,14	1,10	1,12	1,21	1,21	1,21	1,19	1,15	1,05	1,08	1,05
AU-Fälle je VJ Neue BL	1,10	1,06	1,12	1,25	1,25	1,27	1,26	1,20	1,07	1,13	1,11
AU-Fälle je VJ Berlin	1,17	1,13	1,13	1,26	1,24	1,23	1,20	1,13	1,02	1,11	1,08
AU-Tage je VJ Alte BL	16,3	14,7	14,6	15,7	15,5	15,7	15,4	14,5	12,8	12,8	12,3
AU-Tage je VJ Neue BL	16,4	14,7	15,7	17,2	17,5	17,8	17,4	16,3	14,5	14,8	14,1
AU-Tage je VJ Berlin	22,2	19,4	18,7	20,9	21,2	21,1	19,7	18,5	16,0	16,6	15,8

Tabelle A 47: AU-Fälle nach ICD10-Kapiteln: 2006  
(Erwerbstätige insgesamt; stand.)

	ICD10-Kapitel	Männer Fälle je 100 VJ	Frauen Fälle je 100 VJ	gesamt Fälle je 100 VJ
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,2	8,5	8,3
II	Neubildungen	1,2	1,8	1,4
IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	0,5	0,6	0,6
V	Psychische u. Verhaltensstörungen	3,1	5,6	4,1
VI-VIII	Krankh. des Nervensystems und der Sinnesorgane	4,5	5,5	4,9
IX	Krankh. d. Kreislaufsystems	3,3	3,1	3,2
X	Krankh. d. Atmungssystems	26,8	31,5	28,7
XI	Krankh. d. Verdauungssystems	13,9	14,2	14,0
XII	Krankh. d. Haut u. d. Unterhaut	1,9	1,5	1,7
XIII	Krankh. d. Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	19,2	14,9	17,4
XIV	Krankh. d. Urogenitalsystems	1,3	4,6	2,7
XV	Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett	0,0	2,9	1,2
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde	4,4	6,2	5,2
XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. a. Folgen äußerer Ursachen	14,2	7,6	11,4
	insgesamt	103,2	110,0	106,0

Tabelle A 48: AU-Tage nach ICD10-Kapiteln: 2006  
(Erwerbstätige insgesamt; stand.)

	ICD10-Kapitel	Männer Tage je 100 VJ	Frauen Tage je 100 VJ	gesamt Tage je 100 VJ
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	45	47	46
II	Neubildungen	44	74	56
IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	9	11	10
V	Psychische u. Verhaltensstörungen	107	176	136
VI-VIII	Krankh. des Nervensystems und der Sinnesorgane	53	60	56
IX	Krankh. d. Kreislaufsystems	76	46	63
X	Krankh. d. Atmungssystems	165	195	178
XI	Krankh. d. Verdauungssystems	86	79	83
XII	Krankh. d. Haut u. d. Unterhaut	24	16	20
XIII	Krankh. d. Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	348	290	324
XIV	Krankh. d. Urogenitalsystems	14	44	27
XV	Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett	0	38	16
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde	37	52	43
XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. a. Folgen äußerer Ursachen	254	132	204
	insgesamt	1275	1284	1279



Tabelle A 49: AU-Tage je Fall nach ICD10-Kapiteln: 2006  
(Erwerbstätige insgesamt; stand.)

	ICD10-Kapitel	Männer Tage je Fall	Frauen Tage je Fall	gesamt Tage je Fall
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	5,9	5,8	5,5
II	Neubildungen	38,0	40,9	39,3
IV	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	18,4	16,4	17,8
V	Psychische u. Verhaltensstörungen	39,3	32,7	32,9
VI-VIII	Krankh. des Nervensystems und der Sinnesorgane	34,1	29,6	31,2
IX	Krankh. d. Kreislaufsystems	25,2	15,2	19,5
X	Krankh. d. Atmungssystems	6,3	6,3	6,2
XI	Krankh. d. Verdauungssystems	6,7	5,7	5,9
XII	Krankh. d. Haut u. d. Unterhaut	13,2	11,6	12,0
XIII	Krankh. d. Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	18,9	20,4	18,6
XIV	Krankh. d. Urogenitalsystems	11,7	9,8	10,0
XV	Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett	0,0	13,7	13,0
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde	8,5	8,6	8,3
XIX	Verletzungen, Vergiftungen u. best. a. Folgen äußerer Ursachen	17,9	17,5	17,8
	insgesamt	12,35	11,68	12,06

*Tabelle A 50: Relevante 3stellige ICD10-Diagnosen: AU-Fälle 2006  
(TOP 100 - Sortierung nach zurechenbaren AU-Tagen)*

ICD10	Diagnose	AU-Fälle 2006	AU-Tage 2006	Tage je Fall
M54	Rückenschmerzen	58635	811565	13,8
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	66140	365721	5,5
F32	Depressive Episode	7684	341640	44,5
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6136	259049	42,2
T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	17269	214896	12,4
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	6451	190606	29,5
J20	Akute Bronchitis	26742	181342	6,8
F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	6703	172287	25,7
M75	Schulterläsionen	6162	161927	26,3
K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	34787	148778	4,3
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	20738	136307	6,6
S82	Fraktur d. Unterschenkels, einschließlich d. ob. Sprunggelenkes	1973	130901	66,3
M77	Sonstige Enthesopathien	7327	126435	17,3
M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	7071	117236	16,6
S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	3794	115569	30,5
M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	2634	105891	40,2
A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	24016	103241	4,3
S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	7274	101324	13,9
F45	Somatoforme Störungen	4172	91352	21,9
F48	Anderer neurotische Störungen	4362	89437	20,5
J03	Akute Tonsillitis	15393	87518	5,7
B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	15668	85838	5,5
S52	Fraktur des Unterarmes	1635	85027	52,0
M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1179	82650	70,1
G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	2626	82549	31,4
S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	2263	78554	34,7
F33	Rezidivierende depressive Störung	1175	76202	64,9
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	618	75519	122,2
J01	Akute Sinusitis	12422	72402	5,8
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	5312	70776	13,3
M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	4408	69708	15,8
S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	1974	69531	35,2

ICD10	Diagnose	AU-Fälle 2006	AU-Tage 2006	Tage je Fall
J32	Chronische Sinusitis	10657	69429	6,5
R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9063	68020	7,5
K29	Gastritis und Duodenitis	11612	67171	5,8
M65	Synovitis und Tenosynovitis	4085	66774	16,3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1684	64842	38,5
K40	Hernia inguinalis	2466	62888	25,5
F41	Andere Angststörungen	1461	61486	42,1
K08	Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	23787	61257	2,6
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1672	56561	33,8
M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klass.	5439	51647	9,5
J02	Akute Pharyngitis	9768	51615	5,3
M47	Spondylose	2579	49031	19,0
S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	917	44981	49,1
M79	Sonstige Krankheiten d. Weichteilgewebes, anderenorts n. klass.	2908	44108	15,2
I83	Varizen der unteren Extremitäten	2560	43322	16,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	505	43255	85,7
D25	Leiomyom des Uterus	1076	39904	37,1
S13	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	3249	39117	12,0
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	6668	38988	5,8
I20	Angina pectoris	1500	38852	25,9
M19	Sonstige Arthrose	1293	38492	29,8
M13	Sonstige Arthritis	2370	38327	16,2
M50	Zervikale Bandscheibenschäden	858	36128	42,1
J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	6037	36032	6,0
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	5803	35438	6,1
S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	2678	35159	13,1
M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	770	34358	44,6
S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	966	33466	34,6
I63	Hirnininfarkt	315	33339	105,8
R53	Unwohlsein und Ermüdung	2577	32469	12,6
S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	1059	32417	30,6
S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	2000	32310	16,2
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2069	31743	15,3
S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	382	31466	82,4
S06	Intrakranielle Verletzung	1431	31339	21,9
S86	Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels	920	30321	33,0
J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	4954	30317	6,1

ICD10	Diagnose	AU-Fälle 2006	AU-Tage 2006	Tage je Fall
R42	Schwindel und Taumel	3336	30255	9,1
F20	Schizophrenie	521	30161	57,9
G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	742	30141	40,6
K80	Cholelithiasis	1495	27806	18,6
S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	2059	26047	12,7
M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	2043	26002	12,7
J45	Asthma bronchiale	2568	25601	10,0
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4220	25480	6,0
R50	Fieber unbekannter Ursache	3534	25400	7,2
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1527	25375	16,6
D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	1166	25005	21,4
S72	Fraktur des Femurs	234	24751	105,8
K57	Divertikulose des Darms	1397	24146	17,3
M22	Krankheiten der Patella	794	24112	30,4
S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	2065	24014	11,6
S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	2168	23857	11,0
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	367	23776	64,8
G43	Migräne	6117	23737	3,9
L02	Hautabszeß, Furunkel und Karbunkel	2123	23396	11,0
J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4388	23226	5,3
R51	Kopfschmerz	4231	22139	5,2
J34	Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen	1547	21841	14,1
M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1171	21597	18,4
H81	Störungen der Vestibularfunktion	1505	21575	14,3
M48	Sonstige Spondylopathien	289	19888	68,8
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	149	19713	132,3
H93	Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert	1412	19652	13,9
L03	Phlegmone	1844	19436	10,5
O20	Blutung in der Frühschwangerschaft	1074	19251	17,9
I84	Hämorrhoiden	2069	19237	9,3
M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	1152	18720	16,3
	gesamt	772752	9893627	12,8
	Anteil Top100-Diagnosen an gesamt	75,6%	73,5%	

Tabelle A 51: AU-Fälle und -Tage in ausgewählten Berufsgruppen: 2006 (stand.)

Berufsgruppe	Fälle je VJ		Tage je VJ	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
191...302 Metall sonst. <sup>24</sup>	1,28	1,18	15,07	13,43
221 Metall: Dreher	1,23	1,60	14,46	19,45
222 Metall: Fräser	1,21	1,55	13,06	9,27
225 Metall: Schleifer	1,22	1,47	13,87	13,88
273 Metall: Schlosser	1,21	1,43	13,70	16,06
274 Metall: Betr.Schlosser	1,21	1,28	14,01	11,67
284 Metall: Feinmechaniker	1,14	1,34	11,39	14,46
285 Metall: Mechan. sonstige	1,19	1,57	12,68	16,43
291 Metall: Werkzeugmech.	1,08	1,25	11,66	12,86
303 Zahntechniker	0,70	0,94	8,63	9,98
304-306 Optiker, Modellbauer	0,68	0,85	7,62	8,38
311 Elektroinstallateur	1,11	1,50	12,25	16,63
312,13,15 Elektr.Sonstige	1,04	1,23	10,91	14,80
314 El. Gerätebau	1,09	1,40	11,32	15,94
321-323 Montierer, Metallberufe	1,26	1,50	15,13	17,49
441-514 Tischler, Maler	1,23	1,28	16,13	14,20
521-522 Warenprüfer	1,17	1,35	13,08	16,58
531 Hilfsarbeiter	1,35	1,54	14,42	16,88
541-549 Maschinisten	1,16	1,29	13,76	14,41
601-612 Ingenieure etc.	0,67	1,01	6,50	9,85
621-635 Techniker	0,88	1,20	8,53	10,56
681-706 Waren / Dienstleistungen	0,88	1,07	9,49	11,93
711-744 Verkehr	1,13	1,49	15,10	17,96
751-784 Verwaltung	0,83	1,10	8,41	10,24
791-814 Ordnung / Sicherheit	1,05	1,23	13,59	16,35
841-857 Gesundheitsberufe	0,93	1,01	11,71	11,99
861-893 Sozialberufe	0,88	1,29	9,82	13,75
901-937 Allg.Dienstl.	1,07	1,18	14,60	14,71
Arbeitslos	0,51	0,56	17,58	15,10
Insgesamt	1,03	1,10	12,75	12,84

<sup>24</sup> Gruppen 191-220, 223-24, 226-72, 275-83, 286-90, 292-302

