



BARMER

Gesundheitsreport 2018

Ergebnisse zu Rheinland-Pfalz

Thomas G. Grobe, Susanne Steinmann,
Julia Gerr

Impressum

Herausgeber:

BARMER

Postfach 110704

10837 Berlin

Autoren:

Thomas G. Grobe, Susanne Steinmann und Julia Gerr

aQua – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen
GmbH, Maschmühlenweg 8–10, 37073 Göttingen

Konzeption, Redaktion und fachliche Prüfung:

Nora Hoffmann, Ursula Marschall, Nicole Osterkamp

BARMER, Berlin und Wuppertal

Endredaktion, Design und Realisation:

zweiband.media GmbH, Berlin

Im Sinne der besseren Lesbarkeit wurde überwiegend die grammatikalisch männliche Sprachform gewählt. Wenn im Text die männliche Sprachform genannt ist, ist damit sowohl die männliche als auch die weibliche Sprachform gemeint.

Die Datenanalysen bis einschließlich 2017 beziehen sich auf den Datenbestand der vormaligen BARMER GEK. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die in diesem Buch verwendeten und nicht besonders kenntlich gemachten, durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	4
1.1 Neuerungen.....	4
1.2 Methodische Hinweise.....	5
2 Wichtige Ergebnisse zu Rheinland-Pfalz im Überblick.....	6
3 Arbeitsunfähigkeiten.....	7
3.1 Grundlegende Kennzahlen und Entwicklungen 2017	7
3.2 Fehlzeiten auf Kreisebene.....	8
4 Diagnosen der Arbeitsunfähigkeit.....	12
4.1 Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Krankheitsarten	12
4.2 Fehlzeiten nach Krankheitsarten	13
4.3 Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Einzeldiagnosen	15
4.4 Fehlzeiten nach Einzeldiagnosen	16
5 Regionale Variationen von Fehlzeiten nach Krankheitsarten auf Kreisebene	17

1 Einleitung

1.1 Neuerungen

Zum 1. Januar 2017 fusionierte die BARMER GEK mit der Deutschen BKK zur BARMER. Bereits im Jahr 2017 änderte sich entsprechend die Benennung des Gesundheitsreportes in BARMER Gesundheitsreport. Zum Gesundheitsreport 2018 standen für Auswertungen bereits auch Daten zu den vormaligen Mitgliedern der Deutschen BKK zur Verfügung. Um diese erstmals bereitgestellten Daten jedoch vor einer Berücksichtigung im Report sorgfältig prüfen zu können und eventuelle Brüche bei der Vielzahl an Gegenüberstellungen mit Vorjahresergebnissen zu vermeiden, wurden auch bei den Analysen zum diesjährigen Gesundheitsreport noch ausschließlich Daten zu den Mitgliedern der vormaligen BARMER GEK berücksichtigt. Zur sprachlichen Vereinfachung wird im Dokument nachfolgend bereits durchgängig von BARMER-Daten gesprochen.

In den Jahren von 2011 bis 2016 erschien der Gesundheitsreport der BARMER jeweils in Form von 16 Bundesland-bezogenen Reporten. Mit dem Gesundheitsreport 2017 wurde dann wieder ein einheitlicher Gesundheitsreport der BARMER mit bundesweiten sowie auch ausgewählten regionalen Ergebnissen in einem beschränkten Umfang herausgegeben. Das vorliegende Dokument ergänzt den bundesweiten Gesundheitsreport 2018 um detailliertere regionale Ergebnisse speziell zu Rheinland-Pfalz und beinhaltet dabei unter anderem auch Ergebnisse zu den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten innerhalb des Bundeslandes. Entsprechende Dokumente im Sinne von ergänzenden Länderreporten sind auch für die übrigen 15 Bundesländer verfügbar.

1.2 Methodische Hinweise

Ergebnisse von Statistiken zu Arbeitsunfähigkeiten hängen von vielen Faktoren ab. Umfangreiche Erläuterungen zu Einflussfaktoren auf die Arbeitsunfähigkeit sowie zu den durchgeführten Berechnungen finden sich im Anhang des BARMER Gesundheitsreports im Kapitel „Datengrundlagen und Methoden“ unter der Zwischenüberschrift „Arbeitsunfähigkeiten – wesentliche Determinanten“. Bei den dargestellten Ergebnissen auf Bundesland- und Kreisebene handelt es sich durchgängig um standardisierte Ergebnisse. Die Alters- und Geschlechtsunterschiede in den einzelnen Subgruppen werden dabei rechnerisch ausgeglichen, so dass die aufgezeigten Unterschiede hinsichtlich des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens nicht auf die unterschiedliche Geschlechts- und Altersstruktur in den Bundesländern zurückzuführen sind.

2 Wichtige Ergebnisse zu Rheinland-Pfalz im Überblick

- Von den bei bundesweiten Auswertungen 2017 berücksichtigten Erwerbspersonen wohnten 185 Tausend (5,3 Prozent) in Rheinland-Pfalz. Für die Auswertungen zu Arbeitsunfähigkeiten in Rheinland-Pfalz konnten damit Daten zu etwa 12,9 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz berücksichtigt werden.
- Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fehlzeiten in Rheinland-Pfalz geringfügig, nämlich um 0,8 Prozent beziehungsweise 0,14 Tage je Person, zurückgegangen (vgl. Tabelle 3.1).
- Der Krankenstand lag nach geschlechts- und altersstandardisierten Auswertungen in Rheinland-Pfalz bei 4,86 Prozent. Bezogen auf eine einzelne Erwerbsperson entspricht das durchschnittlich 17,7 gemeldeten Arbeitsunfähigkeitstagen im Jahr 2017 (vgl. Tabelle 3.1). Bundesweit ermittelte Fehlzeiten wurden in Rheinland-Pfalz 2017 damit um 0,8 Prozent geringfügig überschritten.
- Für den Rückgang des Krankenstandes waren auch in Rheinland-Pfalz maßgeblich deutlich rückläufige Fehlzeiten mit Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems im Jahr 2017 verantwortlich (vgl. Tabelle 4.1).
- Auf die vier relevantesten Krankheitsarten entfielen in Rheinland-Pfalz 2017 insgesamt 67,4 Prozent und damit mehr als zwei Drittel der Fehlzeiten, dabei 21,9 Prozent auf Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, 19,2 Prozent auf psychische Störungen, 13,7 Prozent auf Atemwegserkrankungen und 12,5 Prozent auf Verletzungen.

3 Arbeitsunfähigkeiten

3.1 Grundlegende Kennzahlen und Entwicklungen 2017

Tabelle 3.1 zeigt Ergebnisse zum regionalen und bundesweiten Arbeitsunfähigkeitsgeschehen im Jahr 2017 sowie Angaben zu relativen Veränderungen bundesweiter und regionaler Zahlen von 2016 auf 2017.

Tabelle 3.1: Grundlegende Kennzahlen zur Arbeitsunfähigkeit 2017

Kennzahl	Rheinland-Pfalz			Bundesweit			Relative Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in Prozent	
	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Rheinland-Pfalz	Bundesweit
Betroffenheitsquote in Prozent	53,9	57,6	55,6	52,5	57,8	54,9	-2,6	-2,1
AU-Fälle je 100 VJ	120	130	125	116	134	124	-3,2	-3,2
AU-Tage je Fall	14,4	14,0	14,2	14,4	13,9	14,1	2,5	2,9
AU-Tage je 100 VJ	1.727	1.827	1.773	1.670	1.861	1.758	-0,8	-0,4
Krankenstand in Prozent	4,73	5,01	4,86	4,58	5,10	4,82	-0,8	-0,4

Quelle: BARMER-Daten 2017, Erwerbspersonen, Altersgruppen 15 bis 64 Jahre, einheitlich standardisiert; VJ: Versicherungsjahr.

Für Erwerbspersonen in Rheinland-Pfalz ergeben die Auswertungen für 2017 nur geringe Abweichungen von bundesweiten Werten. Mit 125 AU-Fällen und 1.773 AU-Tagen je 100 VJ wurden in Rheinland-Pfalz 0,2 Prozent mehr AU-Fälle und 0,8 Prozent mehr AU-Tage als im Bundesdurchschnitt erfasst (vgl. Tabelle 3.1).

Im Vergleich zum Vorjahr sind auch in Rheinland-Pfalz insbesondere die AU-Fallzahlen in geringem Umfang aber auch die Fehlzeiten zurückgegangen, nämlich um 3,2 und 0,8 Prozent (vgl. Tabelle 3.1).

3.2 Fehlzeiten auf Kreisebene

Abbildung 3.1 zeigt eine bundeslandspezifische Darstellung der Fehlzeiten auf Kreisebene mit Einfärbungen von Kreisgebieten entsprechend der relativen Abweichungen der regional beobachteten Fehlzeiten von Fehlzeiten, die aufgrund der regionalen Geschlechts- und Altersstruktur nach bundesweiten Ergebnissen hätten erwartet werden können (vgl. Abschnitte zu indirekter Standardisierung im Methodenteil des BARMER Gesundheitsreports 2018). Die dreistelligen Zahlenangaben in Abbildung 3.1 entsprechen dabei der 3. bis 5. Stelle der amtlichen Gemeinde- beziehungsweise Kreisschlüssel und ermöglichen das Auffinden von Kreisbezeichnungen und Ergebnissen in der nachfolgenden Tabelle 3.2. Die Kombination aus der ersten und zweiten Stelle des Gemeindegemeinschaftsschlüssels kennzeichnet ein Bundesland. Sie ist für alle Kreise eines Bundeslandes identisch und ist daher für die Identifikation von Kreisen innerhalb eines Bundeslandes nicht erforderlich.

Rheinland-Pfalz ist als Bundesland, gemessen an der Fläche, in relativ viele Kreise beziehungsweise kreisfreie Städte gegliedert. Zusätzlich werden in den Darstellungen Kreise des Saarlandes berücksichtigt (die sich durch eine führende „0“ bei den hier angegebenen Kennziffern differenzieren lassen).

Offensichtlich wird mit der Darstellung in Abbildung 3.1, dass die insgesamt nur leicht überdurchschnittlichen Fehlzeiten von Erwerbspersonen in Rheinland-Pfalz vorrangig aus höheren Fehlzeiten von Erwerbspersonen resultieren, die in den mittleren und südlichen Kreisen des Bundeslandes wohnen. Die höchsten Werte mit einer Überschreitung bundesweiter Fehlzeiten um 20,7, 14,1 und 12,7 Prozent ließen sich in Rheinland-Pfalz für die Kreise Kusel (Kreisnummer 07 336), Birkenfeld (Kreisnummer 07 134) und Südwestpfalz (Kreisnummer 07 340) ermitteln.

Demgegenüber finden sich insbesondere in einigen nordwestlichen oder in bestimmten südöstlichen Kreisen in Rheinland-Pfalz auch Fehlzeiten, die unter den nach bundesweiten Ergebnissen ermittelten Erwartungswerten liegen. Dies gilt beispielsweise für die Kreise Mainz (Kreisnummer 07 315: –18,9 Prozent), Koblenz (Kreisnummer 07 111: –13,4 Prozent) und Trier (Kreisnummer 07 211: –11,1 Prozent).

Abbildung 3.1: Relative Abweichungen der Fehlzeiten auf Kreisebene innerhalb von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes 2017




Tabelle 3.2: Relative Abweichungen der AU-Fallzahlen und Fehlzeiten in Kreisen 2016 und 2017

Kreis 07...	Kreise in Rheinland- Pfalz und im Saarland, Bezeichnung	VJ 2017	Rel. Abw. 2016 (Angaben in Prozent)		Rel. Abw. 2017 (Angaben in Prozent)	
			AU-Fälle	AU-Tage	AU-Fälle	AU-Tage
111	Koblenz	4.763	0,4	-9,9	-0,3	-13,4
131	Ahrweiler	6.230	-3,0	-8,8	-5,4	-8,8
132	Altenkirchen (Westerwald)	6.502	-4,0	3,9	-2,4	8,9
133	Bad Kreuznach	10.232	2,7	5,2	2,1	6,2
134	Birkenfeld	5.288	14,2	13,2	13,8	14,1
135	Cochem-Zell	2.068	-6,7	-2,6	-4,0	-1,6
137	Mayen-Koblenz	12.269	0,9	0,2	0,8	-1,6
138	Neuwied	7.696	-5,4	-0,6	-7,4	-2,9
140	Rhein-Hunsrück-Kreis	3.951	3,7	4,5	3,0	7,2
141	Rhein-Lahn-Kreis	5.172	5,9	3,4	4,0	4,2
143	Westerwaldkreis	9.326	-0,6	7,2	0,9	6,0
211	Trier	6.069	-5,2	-8,8	-4,8	-11,1
231	Bernkastel-Wittlich	7.674	-7,6	-8,5	-5,2	-1,3
232	Eifelkreis-Bitburg- Prüm	6.306	-4,8	-4,9	-6,6	-3,7
233	Vulkaneifel	3.225	-8,7	-11,3	-5,0	-8,5
235	Trier-Saarburg	12.147	-3,2	-6,6	-1,9	-5,3
311	Frankenthal (Pfalz)	1.370	2,5	8,6	1,8	3,8
312	Kaiserslautern	2.229	-3,0	11,6	-4,3	0,0
313	Landau in der Pfalz	1.871	-4,0	0,7	-6,3	-8,3
314	Ludwigshafen am Rhein	4.214	5,1	11,6	1,9	8,9
315	Mainz	8.401	-6,3	-16,1	-8,4	-18,9
316	Neustadt an der Weinstraße	1.246	-1,3	0,0	7,7	-0,8
317	Pirmasens	331	-15,4	-7,0	-14,0	0,7
318	Speyer	2.100	0,5	0,0	1,3	1,7
319	Worms	3.017	2,7	7,1	0,4	5,1
320	Zweibrücken	1.678	-1,8	14,4	-4,4	7,7
331	Alzey-Worms	6.140	5,5	-1,5	7,2	1,8

Kreis 07...	Kreise in Rheinland- Pfalz und im Saarland, Bezeichnung	VJ 2017	Rel. Abw. 2016 (Angaben in Prozent)		Rel. Abw. 2017 (Angaben in Prozent)	
			AU-Fälle	AU-Tage	AU-Fälle	AU-Tage
332	Bad Dürkheim	5.404	-7,6	-4,4	-7,1	-2,9
333	Donnersbergkreis	2.596	5,7	18,9	5,3	11,3
334	Germersheim	3.996	-6,3	-5,7	-3,3	-5,0
335	Kaiserslautern	4.551	2,6	8,0	3,1	8,2
336	Kusel	3.172	1,7	19,6	3,5	20,7
337	Südliche Weinstraße	4.431	-5,4	4,9	-7,3	0,4
338	Rhein-Pfalz-Kreis	5.721	-1,5	7,5	0,4	1,3
339	Mainz-Bingen	9.449	2,0	-6,0	3,1	-7,1
340	Südwestpfalz	4.094	-5,0	21,2	-3,5	12,7
041	Stadtverband Saarbrücken	13.266	-4,0	7,0	-2,1	7,7
042	Merzig-Wadern	7.092	-4,6	12,5	-5,2	19,5
043	Neunkirchen	6.503	1,0	21,7	1,5	25,4
044	Saarlouis	9.016	-6,0	10,9	-5,3	14,2
045	Saarpfalz-Kreis	10.082	1,2	19,1	2,5	18,2
046	St. Wendel	6.670	5,1	18,5	5,7	23,8
AU-Fälle und -Tage je 100 VJ Bundesweit			129	1.765	124	1.758

Quelle: BARMER-Daten 2016 und 2017, Erwerbspersonen, Altersgruppen 15 bis 64 Jahre, indirekt standardisiert, relative Abweichungen regional beobachteter von den nach bundesweiten Ergebnissen strukturabhängig regional erwarteten Werten. Der Wert 0 Prozent resultiert bei Übereinstimmung, kleinere Werte bei Unterschreiten und größere Werte bei Überschreiten. Wohnortbezogene Zuordnung von Erwerbspersonen. VJ: Versicherungsjahr.

4 Diagnosen der Arbeitsunfähigkeit

Diagnosen liegen für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in Form von Diagnoseschlüsseln der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ in der 10. Revision – kurz „ICD-10“ – vor (vgl. auch Erläuterungen im Anhang des BARMER Gesundheitsreports 2018). In der ICD-10 werden Krankheiten hierarchisch gegliedert. Die höchste Gliederungsebene der ICD-10 umfasst insgesamt 22 Kapitel. Die entsprechend zusammengefassten Krankheiten werden oftmals auch als „Krankheitsarten“ bezeichnet. Auswertungen auf der Ebene dieser Krankheitsarten können einen grundlegenden Überblick zu den Ursachen von Arbeitsunfähigkeiten geben.

Tabelle 4.1 zeigt regionale Ergebnisse zur Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeitsfällen und Arbeitsunfähigkeitstagen je 100 Versicherungsjahre mit Zuordnungen zu einzelnen Krankheitsarten für Männer, Frauen und die Gesamtgruppe sowie regionale Gesamtgruppenwerte auch zum Vorjahr 2016 und schließlich bundesweite Werte zum aktuell betrachteten Jahr 2017.

4.1 Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Krankheitsarten

Mit Abstand die meisten Arbeitsunfähigkeitsfälle werden regelmäßig unter der Diagnose von „Krankheiten des Atmungssystems“ erfasst. Zu „Krankheiten des Atmungssystems“ zählen insbesondere auch typische Erkältungskrankheiten. Den zweiten Rang bezogen auf die Fallhäufigkeiten belegen nach bundesweiten Auswertungen „Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems“, zu denen insbesondere diverse Erkrankungen des Rückens zählen. Von verhältnismäßig großer Relevanz im Hinblick auf die AU-Fallzahlen sind des Weiteren „Krankheiten des Verdauungssystems“, „Infektiöse und parasitäre Krankheiten“ und „Verletzungen“.

In Rheinland-Pfalz werden die bundesweit ermittelten AU-Fallzahlen im Hinblick auf alle genannten Fallzahl-relevanten Krankheitsgruppen, unter Ausnahme von „Krankheiten des Verdauungssystems“, geringfügig überschritten.

4.2 Fehlzeiten nach Krankheitsarten

Für die Fehlzeiten von Erwerbspersonen haben vier Krankheitsarten eine besonders große Bedeutung, namentlich „psychischen Störungen“, „Krankheiten des Atmungssystems“, „Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems“ sowie „Verletzungen“, wobei sich bundesweit die meisten Fehltag den „Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems“ zuordnen lassen. Typische Erkrankungen höherer Altersgruppen wie „Neubildungen“ und „Krankheiten des Kreislaufsystems“ spielen dagegen als Ursachen von Arbeitsunfähigkeiten im typischen Erwerbsalter noch eine vergleichsweise geringe Rolle.

Im Hinblick auf viele Krankheitsarten werden bundesweite Ergebnisse in Rheinland-Pfalz geringfügig überschritten. Die höchsten Überschreitungen durchschnittlicher bundesweit ermittelter Fehltag lässt sich im Hinblick auf „Psychische Störungen“, „Krankheiten des Kreislaufsystems“ und „Verletzungen“ feststellen.

Tabelle 4.1: Arbeitsunfähigkeit nach Krankheitsarten 2017 in Rheinland-Pfalz

ICD-10-Diagnosekapitel	AU-Fälle je 100 VJ					AU-Tage je 100 VJ				
	Männer	Frauen	Gesamt	Gesamt 2016	Gesamt Bundesweit	Männer	Frauen	Gesamt	Gesamt 2016	Gesamt Bundesweit
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	12,7	12,9	12,8	13,9	12,8	73	73	73	76	74
Neubildungen	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0	60	102	79	85	83
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	4	2	3	4	3
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	13	13	13	13	14
Psychische und Verhaltensstörungen	5,8	9,2	7,4	7,4	7,4	286	406	341	338	335
Krankheiten des Nervensystems	2,5	3,9	3,1	3,2	3,2	45	56	50	49	48
Krankheiten des Auges	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	12	13	12	12	13
Krankheiten des Ohres	1,4	1,7	1,6	1,6	1,6	14	17	15	16	15

ICD-10-Diagnosekapitel	AU-Fälle je 100 VJ					AU-Tage je 100 VJ				
	Männer	Frauen	Gesamt	Gesamt 2016	Gesamt Bundesweit	Männer	Frauen	Gesamt	Gesamt 2016	Gesamt Bundesweit
Krankheiten des Kreislaufsystems	3,3	2,9	3,1	3,3	3,1	105	56	83	83	77
Krankheiten des Atmungssystems	34,3	40,9	37,4	38,3	36,7	223	268	243	242	243
Krankheiten des Verdauungssystems	11,9	11,8	11,9	12,5	12,6	90	87	89	93	90
Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2,0	1,7	1,8	1,9	1,8	30	20	25	25	24
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	20,1	16,0	18,2	18,8	17,9	409	365	389	406	385
Krankheiten des Urogenitalsystems	1,6	4,4	2,9	3,0	2,9	20	44	31	31	30
Schwangerschaft, Geburt	0,0	2,3	1,1	1,0	1,1	0	29	13	13	13
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	3	4	4	4	3
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	6,2	8,2	7,1	7,3	7,1	53	66	59	59	60
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	12,7	8,0	10,6	10,6	10,0	265	171	222	214	214
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen	0,9	1,4	1,1	1,1	1,4	19	31	25	21	31
Schlüsselnummern für besondere Zwecke	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	5	3	2	1
Alle Diagnosen	119,8	130,5	124,7	128,8	124,4	1.727	1.827	1.773	1.787	1.758

Quelle: BARMER-Daten 2016 und 2017, Erwerbspersonen, Altersgruppen 15 bis 64 Jahre, einheitlich standardisiert; VJ: Versicherungsjahr.

4.3 Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Einzeldiagnosen

Einzelne Erkrankungen im üblichen Sprachsinn werden typischerweise auf der Ebene dreistelliger ICD-10-Schlüssel differenziert. Tabelle 4.2 listet Diagnosen sortiert nach der Rangfolge ihrer fallzahlbezogenen Relevanz nach bundesweit ermittelten Ergebnissen zum Jahr 2017. Bei einem überwiegenden Teil der Diagnosen handelt es sich um akute Erkrankungen und Beschwerden. Mit Abstand die meisten Arbeitsunfähigkeitsfälle entfallen auf die Diagnose „Akute Infektionen der oberen Atemwege“ (ICD-10: J06).

Tabelle 4.2: Fallzahlrelevante Diagnosen regional und bundesweit 2017

ICD-10-Diagnose		AU-Fälle je 100 VJ					
		Rheinland-Pfalz			Bundesweit		
		Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	16,4	18,5	17,3	16,9	20,1	18,4
M54	Rückenschmerzen	7,8	6,0	6,9	7,8	6,2	7,0
A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	7,1	6,8	7,0	6,3	6,3	6,3
K08	Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	3,9	3,8	3,8	4,2	4,5	4,3
B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	2,6	2,7	2,6	3,0	3,6	3,3
J20	Akute Bronchitis	3,6	4,1	3,9	2,7	3,1	2,9
K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	2,3	2,3	2,3	2,7	2,6	2,6
F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	1,6	3,0	2,2	1,6	3,2	2,4
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	2,4	2,7	2,5	2,0	2,4	2,2
R10	Bauch- und Beckenschmerzen	1,3	2,4	1,8	1,2	2,4	1,8
Gesamt		119,8	130,5	124,7	116,2	134,0	124,4

Quelle: BARMER-Daten 2017, Erwerbspersonen, Altersgruppen 15 bis 64 Jahre, einheitlich standardisiert; VJ: Versicherungsjahr.

4.4 Fehlzeiten nach Einzeldiagnosen

Tabelle 4.3 zeigt die zehn relevantesten Diagnosen aus dem Jahr 2017 in der Rangfolge der bundesweit zugeordneten Fehlzeiten. Unter den Diagnosen, auf die die meisten Fehlzeiten entfallen, finden sich regelmäßig „Depressive Episoden“ (ICD-10: F32), „Akute Infektionen der oberen Atemwege“ (ICD-10: J06) sowie „Rückenschmerzen“ (ICD-10: M54).

Tabelle 4.3: Fehlzeitenrelevante Diagnosen regional und bundesweit 2017

ICD-10-Diagnose		AU-Tage je 100 VJ					
		Rheinland-Pfalz			Bundesweit		
		Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	94	110	101	99	122	109
F32	Depressive Episode	87	123	104	85	126	104
M54	Rückenschmerzen	102	84	93	105	87	96
F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	48	83	64	46	85	64
F33	Rezidivierende depressive Störung	45	64	54	37	63	49
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	51	37	45	40	34	37
F48	Andere neurotische Störungen	18	36	26	22	43	31
M75	Schulterläsionen	32	30	31	33	28	31
A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	32	31	32	28	29	29
M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	28	15	22	29	20	25
Gesamt		1.727	1.827	1.773	1.670	1.861	1.758

Quelle: BARMER-Daten 2017, Erwerbspersonen, Altersgruppen 15 bis 64 Jahre, einheitlich standardisiert; VJ: Versicherungsjahr.

5 Regionale Variationen von Fehlzeiten nach Krankheitsarten auf Kreisebene

Der nachfolgende Abschnitt stellt für die vier relevantesten Krankheitsarten regionale Variationen der Fehlzeiten auf der Ebene von Kreisen in geschlechts- und altersstandardisierter Form dar.

Hingewiesen sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf, dass diagnosebezogene Ergebnisse zu Fehlzeiten auf Kreisebene immer mit einer gewissen Zurückhaltung interpretiert werden sollten. Dies gilt insbesondere für stark abweichende Werte in einzelnen Kreisen, die keinem erkennbaren regionalen oder inhaltlich begründbaren Muster folgen. Entsprechende Ergebnisse sollten gegebenenfalls vorrangig einen Anlass für weitergehende Analysen liefern.

Abbildung 5.1 bis Abbildung 5.4 zeigen, hier in regionalspezifischen Kartenausschnitten, relative Abweichungen der Fehlzeiten nach Krankheitsarten in einzelnen Kreisen im Jahr 2017 von Werten, die bei der jeweils kreisspezifischen Geschlechts- und Altersstruktur nach bundesweiten Ergebnissen hätten erwartet werden können („indirekt standardisierte Ergebnisse“). Über die in den Kartendarstellungen angegebenen Ziffernkennungen lassen sich kreisbezogene Einzelergebnisse aus Tabelle 5.1 zuordnen. Rheinland-Pfalz lässt sich nach dem amtlichen Gemeindeschlüssel, der im Sinne einer Bundeslandkennung immer mit den beiden Ziffern „07“ beginnt, in eine vergleichsweise große Anzahl von Kreisen gliedern. Der Gemeindeschlüssel für das Saarland, für das Ergebnisse gleichfalls dargestellt werden, beginnt mit den beiden Ziffern „10“, die in den Kartendarstellungen nicht mit angegeben werden – dort können Kreise des Saarlandes jedoch einfach durch die führende „0“ der auf die 3. bis 5. Stelle des Gemeindeschlüssels verkürzten Ziffernfolgen erkannt werden.

Arbeitsunfähigkeiten mit Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, erfahrungsgemäß oftmals im Zusammenhang mit Rückenbeschwerden, zeigen ausgeprägte regionale Variationen.

Fehlzeiten mit psychischen Störungen lagen vorrangig in nördlichen und südlichen Regionen einschließlich des Saarlandes über den strukturabhängig erwarteten Werten.

Krankheiten des Atmungssystems, erfahrungsgemäß oftmals Erkältungen, führten in nordwestlich und einigen südlich gelegenen Kreisen von Rheinland-Pfalz zu vergleichsweise geringen Fehlzeiten.

Verletzungsbedingte Fehlzeiten lagen in Rheinland-Pfalz in vielen Kreisen über den strukturabhängig erwarteten Werten. Vor allem für einige Kreise in nördlichen und südöstlichen Regionen des Bundeslandes wurden aber im Hinblick auf entsprechende Erkrankungen auch eher geringe Fehlzeiten ermittelt.

Abbildung 5.1: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Versicherungsjahre auf Kreisebene innerhalb von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes 2017, Kapitel XIII – „Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems“





Abbildung 5.2: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Versicherungsjahre auf Kreisebene innerhalb von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes 2017, Kapitel V – „Psychische und Verhaltensstörungen“



Zifferangaben in der Abbildung: Kreisnummern ohne die führenden beiden Ziffern zur Bundeslandkennung (vgl. auch Tabelle 5.1 mit Kreisergebnissen).

Abbildung 5.3: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Versicherungsjahre auf Kreisebene innerhalb von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes 2017, Kapitel X – „Krankheiten des Atmungssystems“




Abbildung 5.4: Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Versicherungsjahre auf Kreisebene innerhalb von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes 2017, Kapitel XIX – „Verletzungen“




Tabelle 5.1: Relative Abweichungen der Fehlzeiten in Kreisen nach Krankheitsarten 2017

Kreis 07...	Kreise in Rheinland- Pfalz und im Saarland, Bezeichnung	Rel. Abw. nach Diagnosekapiteln der ICD-10 (Angaben in Prozent)			
		V Psyche	X Atemwege	XIII Muskel-Skelett	XIX Verletzungen
111	Koblenz	-3,4	1,1	-30,4	-20,1
131	Ahrweiler	2,7	-11,6	-10,8	-19,6
132	Altenkirchen (Westerwald)	4,4	-6,9	9,5	27,2
133	Bad Kreuznach	-12,5	2,6	17,5	14,7
134	Birkenfeld	-6,2	4,5	22,1	19,9
135	Cochem-Zell	-10,2	-5,0	6,2	4,3
137	Mayen-Koblenz	-4,9	-6,5	2,5	0,3
138	Neuwied	13,7	-12,2	3,5	-6,9
140	Rhein-Hunsrück-Kreis	6,1	1,6	2,5	19,0
141	Rhein-Lahn-Kreis	10,4	3,2	10,9	2,2
143	Westerwaldkreis	4,6	-0,8	10,9	17,4
211	Trier	-5,8	-7,3	-15,9	-12,6
231	Bernkastel-Wittlich	-3,5	-15,6	7,2	5,6
232	Eifelkreis-Bitburg-Prüm	-21,7	-22,4	-0,6	41,5
233	Vulkaneifel	-16,2	-22,3	15,2	5,4
235	Trier-Saarburg	-9,8	-5,6	0,0	1,9
311	Frankenthal (Pfalz)	27,2	3,1	-20,5	-8,5
312	Kaiserslautern	37,9	7,0	-18,7	-21,5
313	Landau in der Pfalz	16,3	-2,7	-29,7	-9,6
314	Ludwigshafen am Rhein	20,9	24,2	-0,6	-3,0
315	Mainz	-12,5	-6,3	-30,9	-15,9
316	Neustadt an der Weinstraße	0,9	4,7	-12,1	14,9
317	Pirmasens	-39,9	23,8	3,1	25,3
318	Speyer	13,9	16,6	-12,6	-5,9
319	Worms	11,1	7,6	8,7	9,4
320	Zweibrücken	9,9	5,1	15,8	-9,9
331	Alzey-Worms	-0,4	12,3	0,9	-11,9
332	Bad Dürkheim	0,9	1,5	-11,4	-8,3

Kreis 07...	Kreise in Rheinland- Pfalz und im Saarland, Bezeichnung	Rel. Abw. nach Diagnosekapiteln der ICD-10 (Angaben in Prozent)			
		V Psyche	X Atemwege	XIII Muskel-Skelett	XIX Verletzungen
333	Donnersbergkreis	3,3	19,2	28,0	13,1
334	Germersheim	24,9	-5,5	-15,5	-23,4
335	Kaiserslautern	16,2	16,3	2,2	-3,5
336	Kusel	29,1	14,4	21,9	18,6
337	Südliche Weinstraße	7,8	-14,3	1,3	27,7
338	Rhein-Pfalz-Kreis	4,4	4,6	-1,6	2,5
339	Mainz-Bingen	-8,8	8,5	-10,9	-7,1
340	Südwestpfalz	31,5	6,4	5,0	-0,4
041	Stadtverband Saarbrücken	27,7	-0,1	-5,7	1,7
042	Merzig-Wadern	15,7	1,4	21,3	6,2
043	Neunkirchen	41,1	14,5	16,8	23,6
044	Saarlouis	21,8	-1,5	7,8	15,2
045	Saarpfalz-Kreis	24,6	13,7	21,9	4,9
046	St. Wendel	13,9	18,3	28,4	23,0
AU-Tage je 100 VJ Bundesweit		335	243	385	214

Quelle: BARMER-Daten 2017, Erwerbspersonen, Altersgruppen 15 bis 64 Jahre, indirekt standardisiert, relative Abweichungen regional beobachteter von den nach bundesweiten Ergebnissen strukturabhängig regional erwarteten Werten. Der Wert 0 Prozent resultiert bei Übereinstimmung, kleinere Werte bei Unterschreiten und größere Werte bei Überschreiten. Auswertungen wohnortbezogen. Aufgeführte Diagnosekapitel der ICD-10: „V Psychische und Verhaltensstörungen“; „X Krankheiten des Atmungssystems“; „XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes“; „XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen“.